

foglio illustrativo

**AURIZON®
GOCCE OTOLOGICHE PER CANI
USO VETERINARIO**

1. NOME O INDIRIZZO O SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

VETOQUINOL S.A
B.P. 189
Magny-Vernois
F-70204 LURE Cedex

Distributore per l'Italia: Vétoquinol Italia S.r.l. - Bertinoro (FC) (I)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

AURIZON® gocce auricolari, sospensione

3. COMPOSIZIONE

1 ml di AURIZON® contiene:

Principi attivi

Marbofloxacin.....3,0 mg
Clotrimazolo.....10,0 mg
Desametasone acetato.....1,0 mg
(equivalente a desametasone.....0,9 mg)

Eccipienti

Propile gallato (E310).....1,0 mg
Sorbitano oleato, silice colloidale anidra, trigliceridi saturi a catena media.

4. INDICAZIONI

Terapia delle otiti esterne sostenute sia da batteri sensibili a marbofloxacin che da miceti, in particolare *Malassezia pachydermatis*, sensibili a clotrimazolo.

Il prodotto dovrebbe essere impiegato sulla base di test di sensibilità.

5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare ai cani affetti da perforazione timpanica.

Non somministrare in caso di accertata ipersensibilità anche a uno solo dei componenti del prodotto.

Non somministrare alle cagne in gravidanza o in allattamento.

6. REAZIONI AVVERSE

Si possono manifestare alcuni effetti collaterali propri delle sostanze contenenti corticosteroidi (modificazione dei parametri biochimici ed ematologici, come incremento di fosfatasi alcalina e di aminotransferasi e moderata neutrofilia).

L'uso eccessivo e prolungato di prodotti ad uso topico contenenti corticosteroidi potrebbe causare reazioni locali e sistemiche, quali soppressione della funzionalità surrenale, assottigliamento dell'epidermide e ritardo nella cicatrizzazione delle ferite.

In rare occasioni, l'uso del prodotto può essere associato a sordità, prevalentemente di natura transitoria, soprattutto nei cani anziani.

7. **SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cane.

8. **DOSI DA SOMMINISTRARE E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Agitare bene prima dell'uso.

Somministrare 10 gocce direttamente nell'orecchio una volta al giorno per 7-14 giorni.

Dopo i primi 7 giorni di trattamento il Medico Veterinario dovrebbe valutare se proseguire il trattamento per un'altra settimana.

Una goccia di prodotto contiene 71 µg di marbofloxacin, 237 µg di clotrimazolo e 23.7 µg di desametasone acetato.

Dopo la somministrazione, allo scopo di facilitare la diffusione del prodotto nella porzione inferiore del canale auricolare, effettuare un lieve massaggio alla base dell'orecchio.

Se il prodotto viene somministrato a più cani utilizzare una cannula diversa per ogni soggetto.

9. **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

L'uso esclusivo di una sola classe di antibiotici potrebbe dare origine a fenomeni di resistenza batterica. In tal senso potrebbe essere più indicato limitare l'uso di fluorochinoloni per il trattamento di affezioni cliniche che hanno risposto, o che si suppone rispondano, scarsamente alle altre classi di antibiotici.

Prima della somministrazione del prodotto, verificare l'integrità della membrana timpanica.

Prima della somministrazione del prodotto pulire ed asciugare accuratamente il condotto auricolare esterno.

10. **SOVRADOSAGGIO (SINTOMI, PROCEDURE D'EMERGENZA, ANTIDOTI), SE NECESSARIO**

Con dosaggi 3 volte superiori alla dose consigliata si osservano alterazioni di alcuni parametri ematologici e biochimici (incremento di fosfatasi alcalina e aminotransferasi, lieve neutrofilia, eosinopenia e linfopenia); tali alterazioni non sono gravi e regrediscono non appena il trattamento viene interrotto.

11. **PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore a 30° C.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

Validità: 2 anni.

Dopo prima apertura utilizzare entro 2 mesi.

12. **PRECAUZIONI SPECIALI PER LA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO AGLI ANIMALI**

Lavarsi accuratamente le mani dopo la somministrazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto accidentale lavare accuratamente con acqua.

Le persone con ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto dovrebbero evitare ogni contatto con il prodotto.

12. **PRECAUZIONI SPECIALI PER ELIMINARE IL PRODOTTO INUTILIZZATO E/O MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO**

Il prodotto inutilizzato e i flaconi vuoti devono essere eliminati secondo le norme nazionali.

13. **CONFEZIONI**

- Flacone da 10 ml + 1 cannula

- Flacone da 20 ml + 2 cannule

- Flacone da 30 ml + 3 cannule


MODALITA' DI PREPARAZIONE PER L'USO



1 Svitare il tappo dal flacone



2 Separare la cannula flessibile dal cappuccio di protezione




3 Inserire la cannula sul beccuccio del flacone



4 Dopo ogni utilizzo inserire l'apposito cappuccio di protezione sulla cannula

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

5 Agitare il flacone prima dell'uso



6 Sollevare il padiglione auricolare e posizionare la cannula



(orecchio visto in sezione)

7 Esercitare una leggera pressione sul flacone.



8 Instillare AURIZON® nel canale auricolare esterno

9 Dopo l'applicazione massaggiare la base dell'orecchio per distribuire il prodotto in modo uniforme.