

# BIO-VAC B1



## vaccino vivo liofilizzato per polli

### INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

**Principio attivo:** virus vivo attenuato della pseudopeste aviare ceppo B1 di Hitchner.

**Titolo:** non inferiore a  $10^{6,5}$  D<sub>50</sub>/dose.

### INDICAZIONI

BIO-VAC B1 è indicato per la profilassi immunitaria per via oculo-nasale ed orale (tramite l'acqua di bevanda) per prevenire la mortalità, i sintomi clinici e le lesioni della pseudopeste aviare nei polli.

L'immunità è completa dopo 2 settimane e si mantiene per almeno 2 mesi.

**CONTROINDICAZIONI** - Nessuna nota.

**REAZIONI AVVERSE** - Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE** - Polli.

### POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

BIO-VAC B1 è indicato per via oculo-nasale o per via orale (attraverso l'acqua di bevanda).

**Via oculo nasale** - Per ottenere la sospensione vaccinale è necessario sciogliere il contenuto del flacone nel diluente che è rappresentato da soluzione di cloruro di sodio 0,9% in acqua depurata. Instillare una goccia nell'occhio e una nella narice. Assicurarsi che la goccia della narice sia stata inalata.

**Via orale** - Per ottenere la sospensione vaccinale è necessario aggiungere al contenuto del flacone una piccola quantità d'acqua e sciogliere accuratamente. A questo punto si versa la sospensione nell'acqua di bevanda ritenuta necessaria per la vaccinazione, risciacquando il flacone per evitare che residui di polvere vaccinale rimangano inutilizzati. Quando tutto il contenuto del flacone è stato disciolto nell'acqua di bevanda, si abbia cura di rimescolare subito prima dell'effettiva somministrazione agli animali. La quantità d'acqua necessaria per la vaccinazione varia a seconda dell'età degli animali, della stagione, della temperatura ambiente. Di seguito sono riportati i quantitativi d'acqua minimi e massimi consigliabili in relazione alla prima delle suindicate variabili:

<b>Età polli (sett.)</b>	<b>Quantità d'acqua (litri) 100 dosi</b>	<b>Quantità d'acqua (litri) 1000 dosi</b>
0-2	0,7-1	7-10
3-5	1-2	10-20
6-12	2-6	20-60
oltre 12	5-8	50-80

### Programma vaccinale:

Nei broilers si consiglia di effettuare un primo intervento vaccinale a 4-8 giorni di vita ed un secondo, di richiamo, dopo 3 settimane. Nei riproduttori e nelle ovaiole, oltre ai due interventi previsti per i broilers, ne è necessario un terzo tra la 15<sup>a</sup> e la 20<sup>a</sup> settimana di età, prima, cioè, dell'entrata in ovodeposizione. I successivi richiami sono da ripetersi ad intervalli di tre mesi circa. In caso di necessità, quali sono da considerarsi i periodi di epizootia o la presenza di focolai d'infezione nelle vicinanze dell'allevamento, la prima vaccinazione può essere anticipata ai primi 3 giorni di vita.

## **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Il vaccino liofilizzato deve essere conservato in frigorifero ad una temperatura tra +2°C e +8°C.

Il contenuto di ogni flacone deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura e una volta ricostituito deve essere somministrato entro 2 ore.

## **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Affinché sia garantito il buon esito della vaccinazione è opportuno attenersi alle seguenti norme:

- vaccinare solo animali sani;
- utilizzare il vaccino entro una-due ore dalla sua ricostituzione;
- assicurarsi che gli abbeveratoi e l'acqua di bevanda non contengano sostanze antisettiche o disinfettanti che, anche in tracce, possano inattivare il virus vaccinale;
- utilizzare, ove possibile, abbeveratoi di plastica, vetro, o smaltati;
- assetare gli animali, sospendendo la somministrazione dell'acqua di bevanda, per almeno tre ore prima della vaccinazione;
- distribuire la sospensione vaccinale, ottenuta dalla ricostituzione del preparato, in un numero di abbeveratoi tale da permettere a tutti gli animali l'assunzione del vaccino nell'arco di due-tre ore.

**TEMPO DI ATTESA** - Zero giorni.

## **AVVERTENZE SPECIALI**

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali** - Adottare le misure veterinarie e fitosanitarie per evitare la diffusione alle specie sensibili.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il vaccino agli animali** - Il virus della pseudopeste aviaria può causare congiuntivite nell'uomo. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua ed avvisare il medico.

**Uso durante la gravidanza, l'allattamento e l'ovodeposizione** - Il vaccino può essere somministrato, secondo lo schema vaccinale consigliato, a galline in ovodeposizione.

**Interazione con altri farmaci ed altre forme di interazione** - Non sono disponibili informazioni di sicurezza ed efficacia sull'uso concomitante di questo prodotto con altri vaccini. Non somministrare nessun altro vaccino 14 gg prima o dopo la vaccinazione con questo prodotto.

**Sovradosaggio** - La somministrazione di un sovradosaggio anche decuplo di vaccino, non provoca reazioni avverse.

**Incompatibilità** - Non mescolare questo prodotto con altri vaccini. Nella somministrazione deve essere evitato l'uso di acqua contenente sostanze disinfettanti che potrebbero neutralizzare il virus vaccinale.

**SPECIALI PRECAUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE** - Eliminare i rifiuti mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo approvato per l'uso dalla autorità competente. Il materiale residuo deve essere conferito negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## **Tenere fuori dalla portata dei bambini**

DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** 02/2008

## **SOLO PER USO VETERINARIO**

### **Confezioni**

Flacone da 100 dosi + diluente

Flacone da 1000 dosi

10 flaconi da 1000 dosi

Titolare A.I.C. produttore responsabile del rilascio del lotto:

**FATRO** S.p.A. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

Stabilimento di produzione: **FATRO** S.p.A. - via Molino Emili, 2 - 25030 Maclodio (BS)