

# BIO-MAREK HVT



## **vaccino vivo liofilizzato per polli**

Titolare A.I.C. e titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio del lotto:

**FATRO** S.p.A. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

Fabbricanti: **FATRO** S.p.A. - Via Molino Emili, 2 - 25030 Maclodio (BS)

### **INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

**Principio attivo:** Herpesvirus del tacchino (HVT) ceppo FC-126, liofilizzato; titolo non inferiore a 1500 Unità Formanti Placca (UFP)/dose.

### **INDICAZIONI**

BIO-MAREK HVT è indicato per l'immunizzazione attiva dei polli per prevenire la mortalità, i sintomi e le lesioni della malattia di Marek.

Una sola vaccinazione eseguita correttamente nei primissimi giorni di vita è sufficiente a proteggere l'animale. L'immunità raggiunge un grado significativo dopo 15 giorni dall'inoculazione del vaccino e risulta completa dopo 20-25 giorni.

**CONTROINDICAZIONI** - Nessuna nota.

**REAZIONI AVVERSE** - Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE** - Pollo.

### **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Il vaccino deve essere somministrato per via intramuscolare, preferibilmente nella coscia, con siringa automatica.

Per preparare il vaccino per l'uso è necessario: introdurre per mezzo di una siringa sterile una piccola quantità di diluente (4-5 ml) nel flacone contenente il materiale liofilizzato; dopo che il contenuto è stato ben sciolto versarlo nel flacone del diluente; previa accurata agitazione, il vaccino è pronto per l'uso.

Viene inoculato una sola volta alla dose di 0,2 ml per capo per via intramuscolare, preferibilmente alla coscia, con siringa automatica.

### **Programma vaccinale:**

È raccomandata l'inoculazione all'età di 1-2 giorni, comunque non oltre il 6°-7° giorno.

### **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Una volta diluito il vaccino deve essere utilizzato entro tre ore.

**TEMPI DI ATTESA** - Zero giorni.

## **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

BIO-MAREK HVT va conservato in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C.

### **AVVERTENZE SPECIALI**

#### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Adottare le misure veterinarie e fitosanitarie per evitare la diffusione alle specie sensibili.

#### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Lavarsi le mani dopo l'uso.

In caso di autoinoculazione o ingestione accidentale rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

#### **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

L'uso in ovodeposizione non è raccomandato.

#### **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non sono disponibili informazioni sulla compatibilità di questo vaccino con altri.

Pertanto non sono state dimostrate sicurezza ed efficacia del prodotto usato con altri.

#### **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

La somministrazione di una dose anche 5 volte superiore non provoca reazioni avverse.

#### **Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

## **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Eliminare i rifiuti mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo approvato per l'uso dalle autorità competenti.

Il materiale residuo deve essere conferito negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** 14.08.2008

### **ALTRE INFORMAZIONI**

BIO-MAREK HVT è un vaccino vivo allestito con un ceppo apatogeno di Herpesvirus isolato da tacchino (HVT FC-126).

La sospensione virale liberata dalle cellule mediante sonicazione in apposito stabilizzante, viene liofilizzata e chiusa sotto vuoto.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE**

**SOLO PER USO VETERINARIO**

FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO) - Stabilimento di Maclodio (BS)