

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Buscopanvet Compositum, 4 mg/ml + 500 mg/ml, soluzione iniettabile
per equidi non destinati alla produzione di alimenti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Ingelheim am Rhein – Germania

Rappresentante del titolare:

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Via Lorenzini, 8
20139 Milano

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Labiana Life Sciences S.A.
Barcellona - Spagna

Oppure

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Buscopanvet Compositum, 4 mg/ml + 500 mg/ml, soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principi attivi:

Ioscina butilbromuro	4 mg
Metamizolo sodico	500 mg

Eccipiente:

Fenolo	5 mg
--------	------

4. INDICAZIONI

Colica spastica, intasamento esofageo.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti.
Non usare in cavalli affetti da ileo paralitico e condizioni stenose del canale gastroenterico.

6. REAZIONI AVVERSE

L'eventuale colorazione rossa delle urine è dovuta solo alla presenza di un metabolita innocuo dei pirazolonici.

Si può osservare un leggero aumento transitorio della frequenza cardiaca dovuto all'attività parasimpaticolitica della ioscina butilbromuro.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Equidi non destinati alla produzione di alimenti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Equidi non destinati alla produzione di alimenti: 20 – 30 ml pari a 0,05 ml/kg peso vivo.

La somministrazione deve avvenire per via endovenosa lenta o per via intramuscolare.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Vedere "Posologia, via e modalità di somministrazione".

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare.

Per equidi non destinati alla produzione di alimenti.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Gli anticolinergici devono essere usati con prudenza nei soggetti anziani, nelle tachiaritmie cardiache, nell'insufficienza cardiaca congestizia.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Vedere "Controindicazioni".

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Le persone con nota ipersensibilità ai principi attivi devono somministrare il medicinale veterinario con cautela.

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Il metamizolo può causare agranulocitosi anche gravi.

Gravidanza e allattamento

Usare sotto il controllo del medico veterinario.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Gli effetti della ioscina butilbromuro o del metamizolo possono essere potenziati dall'uso concomitante di altri medicinali anticolinergici o analgesici. Non sono descritte interazioni specifiche.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al tuo medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Ottobre 2014

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezione: flacone da 100 ml.