

# BUTOX® 7,5 Pour On

148904 R5

7,5 mg/ml, sospensione acquosa per uso esterno per bovini e ovini

## 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

MSD Animal Health S.r.l., Via Fratelli Cervi snc  
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova, 20090 Segrate (Milano)

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:**

Intervet Productions S.A., Rue de Lyons, 27460 Igoville (Francia)

## 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Butox® 7,5 Pour On

7,5 mg/ml, sospensione acquosa per uso esterno per bovini e ovini.

## 3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml di sospensione acquosa contengono

**Principi attivi:** deltametrina 0,750 g

**Eccipienti:** soluzione di formaldeide al 30% 0,019 g

## 4. INDICAZIONI

Disinfestazione di bovini e ovini nei confronti delle infestazioni da zecche, pidocchi, mosche e malfolagi degli ovini.

## 5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non usare in animali con ipersensibilità accertata alla deltametrina o ai suoi derivati o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

## 6. REAZIONI AVVERSE

In casi molto rari, possono manifestarsi eritema, prurito, iperattività, irrequietezza, ipersensibilità.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini e ovini.

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE


Il prodotto è un formulato pronto all'uso da applicare lungo la linea mediana del dorso degli animali (dalla base della testa alla coda). Negli ovini, si raccomanda di separare il vello durante la somministrazione.

ZECCHHE	Bovini: 15 ml/ 100 kg p.v. Ovini: 10 ml/ capo
MOSCHE	Bovini e ovini: fino a 100 kg p.v. = 10 ml/ capo da 100 a 300 kg p.v. = 20 ml/ capo oltre i 300 kg p.v. = 30 ml/ capo
PIDOCCHI	Bovini e ovini: 10 ml/ capo (per animali di peso superiore a 500 kg = 20 ml/ capo)


Una singola applicazione del prodotto protegge gli animali da una possibile reinfezione parassitaria per un periodo di circa 8 settimane. Per ottenere la massima efficacia del trattamento antiparassitario, si consiglia di trattare contemporaneamente tutti gli animali.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE


**Modalità d'impiego del dosatore:**



1. Svitare il tappo ② (tappo del serbatoio dosatore del flacone). Lasciare avvitato in permanenza il tappo ①.




2. Posizionare il beccuccio applicatore, fissandolo a pressione nella sua sede e ruotandolo di 1/2 giro.



3. Riempire il serbatoio dosatore facendo pressione sul flacone.



4. Prendere il flacone dalla parte del serbatoio dosatore, tenendo la parte dotata del beccuccio applicatore verso l'alto.



5. Ripartire la dose versando lungo la linea del dorso, dal garrese fino alla base della coda, facendo lieve pressione sul flacone (ripetere l'operazione per i trattamenti su animali che richiedono una dose superiore a 10 ml).  
6. Verificare che tutta la dose venga ben distribuita sul dorso dell'animale.

## 10. TEMPI DI ATTESA

<b>Bovini:</b>	<b>fino a 30 ml/capo</b> carne e visceri: 19 giorni latte: 0 giorni <b>oltre i 30 ml/capo</b> carne e visceri: 19 giorni latte: 120 ore (10 mungiture)
<b>Ovini:</b>	Carne e visceri: 1 giorno Latte: 12 ore (1 mungitura)

## 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

## 12. AVVERTENZE SPECIALI

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'adeguata terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

#### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Durante i primi giorni di utilizzo, si consiglia di controllare l'animale. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

#### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego del prodotto. Durante la somministrazione, evitare di inalare il prodotto ed il contatto con la pelle. Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Lavarsi le mani e la cute esposta subito dopo aver terminato il trattamento o in caso di contatto accidentale. Le persone con nota ipersensibilità alla deltametrina o ad altre permetrine devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mettere il prodotto a contatto con alimenti, con l'acqua, con mangimi ad uso zootecnico e con i recipienti destinati a contenerli. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli. Questo prodotto contiene deltametrina, che può causare formicolio, prurito, rossore e macchie sulla pelle esposta. In caso di malessere a seguito dell'utilizzo di questo prodotto, consultare il medico e mostrargli l'etichetta.

#### **Gravidanza e lattazione**

Può essere somministrato durante la gravidanza e la lattazione.

#### **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione**

Alcuni insetticidi organofosforici possono ridurre la percentuale di metabolizzazione della deltametrina ed aumentarne perciò la tossicità. Tali associazioni sono quindi sconsigliabili.

#### **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)**

Non sono noti sintomi da sovradosaggio. Qualora l'animale ingerisca accidentalmente il prodotto, rivolgersi immediatamente al medico veterinario per un trattamento sintomatico.

#### **Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

### **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Il prodotto non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per gli organismi acquatici.

### **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Settembre 2013.

### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Butox 7,5 Pour On è un ectoparassitocida contenente deltametrina, principio attivo appartenente alla classe dei piretroidi di sintesi. Il suo meccanismo d'azione si esplica a livello della trasmissione nervosa ed in particolare modificando la permeabilità del canale del sodio con conseguente ipereccitabilità dei parassiti, tremori e morte.