

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

CANIGEN® CE/L, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 dose di vaccino contiene:

Flacone FRAZIONE LIOFILIZZATA :

Principi attivi :

- Virus attenuato del Cimurro - ceppo LEDERLE	10 ³ - 10 ⁵ DICP ₅₀
- Adenovirus tipo 2 attenuato - ceppo MANHATTAN	10 ⁴ - 10 ⁶ DICP ₅₀

Flacone FRAZIONE LIQUIDA :

Principi attivi :

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903	4350 - 7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895	4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

Eccipienti :

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione del Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi.
L'immunità inizia 2 settimane dopo la seconda iniezione, per una durata minima di 1 anno.

4.3 Controindicazioni

Non vaccinare durante gestazione ed allattamento.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il vaccino deve essere somministrato seguendo le usuali precauzioni di asepsi per la vaccinazione. Si consiglia un trattamento antiparassitario almeno 10 giorni prima della vaccinazione. Vaccinare solo cani in buona salute.

Evitare una possibile esposizione dell'animale all'infezione nei 21 giorni seguenti la vaccinazione.

Il vaccino deve essere ricostituito immediatamente prima dell'uso.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con ipersensibilità accertata verso il prodotto devono evitare il contatto. Maneggiare il prodotto con attenzione al fine di evitare autoinoculazione accidentale.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nel punto di inoculo, si può occasionalmente osservare, un piccolo e transitorio nodulo.

Come per tutti gli altri vaccini, una occasionale reazione di ipersensibilità può essere osservata in alcuni animali. Se si verificasse reazione anafilattica, instaurare rapidamente una cortico-terapia (se possibile, ad alte dosi per via i.v.) o somministrare antistaminici oltre all'usuale terapia per lo shock anafilattico.

4.7 Utilizzazione durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non vaccinare durante la gravidanza ed allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non somministrare corticosteroidi o non effettuare cure antivirali nei giorni precedenti o seguenti la vaccinazione.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Il flacone di CANIGEN[®] CE deve essere ricostituito con l'intero contenuto di CANIGEN[®] L.

Si deve somministrare l'intero contenuto del flacone ricostituito.

Prima vaccinazione

Cuccioli a partire da 8-9 settimane di età:

Una dose per via sottocutanea di CANIGEN[®] CE/L seguita da un'altra dopo 3-4 settimane ma mai prima delle 12 settimane di età.

Cuccioli di età superiore alle 9 settimane:

Una dose per via sottocutanea di CANIGEN[®] CE/L seguita da un'altra dopo 3-4 settimane.

Richiamo

Richiamo annuale con una dose per via sottocutanea di CANIGEN[®] CE/L.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

La somministrazione di una dose 10 volte maggiore di CANIGEN[®] CE con una dose 2 volte maggiore di CANIGEN[®] L non ha provocato effetti collaterali.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ IMMUNOLOGICHE

II CANIGEN® CE/L stimola le difese umorali ed i meccanismi di mediazione cellulare, induce nel cane una immunità attiva e duratura nei confronti del cimurro, dell'epatite infettiva e della leptospirosi.

Codice ATC VET : QI07AI01

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Frazione liofilizzata :

Idrossido di potassio – Lattosio – Acido L-glutammico – Fosfato monopotassico – Fosfato dipotassico – Gelatina – Acqua per preparazioni iniettabili – gentamicina solfato

Frazione liquida :

Saccarosio – Fosfato dipotassico – Fosfato monopotassico – Triptone – Acqua per preparazioni iniettabili.

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non mescolare questo prodotto con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo ricostituzione: utilizzare immediatamente.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare e trasportare in frigorifero (2°C a - 8°C). Proteggere dalla luce. Non congelare..

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

CANIGEN® CE : flacone di vetro tipo I da 3 ml contenente la frazione liofilizzata, chiuso ermeticamente con tappo in gomma butilica e ghiera in alluminio

CANIGEN® L : flacone di vetro tipo I da 3 ml contenente la frazione liquida, chiuso ermeticamente con tappo in gomma butilica e ghiera in alluminio

Scatola da 1 dose con siringa

Scatola da 1 dose senza siringa

Scatola da 10 dosi (10 flaconi + 10 flaconi)

Scatola da 30 dosi (30 flaconi + 30 flaconi)

Scatola da 50 dosi (50 flaconi + 50 flaconi)

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

I medicinali veterinari non utilizzati e i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere eliminati mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo autorizzato per l'uso dell'autorità competenti.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m – LID
06516 Carros
FRANCIA

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Scatola da 1 dose con siringa AIC N° 101826042
Scatola da 1 dose senza siringa AIC N° 101826016
Scatola da 10 dosi AIC N° 101826028
Scatola da 30 dosi AIC N° 101826030
Scatola da 50 dosi AIC N° 101826055

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data di prima autorizzazione: 04/08/1995
Data dell'ultimo rinnovo: 31/12/2007

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

3/2019

Divieto di fornitura, vendita e/o impiego

Non pertinente

MODALITA' DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile

Etichettatura & foglietto Illustrativo

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONDIZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

FLACONE LIQUIDO DA 1 DOSE (etichetta autoadesiva "peel-off")

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Canigen L, Sospensione iniettabile per cani

2. QUANTITÀ DI PRINCIPI ATTIVI

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903	4350 -7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895	4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

1 dose

4. VIA DI SOMMINISTRAZIONE

SC

5. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

6. NUMERO DI LOTTO

LOTTO : {numero}

7. DATA DI SCADENZA

SCAD : {MM/AAAA}

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONDIZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

FLACONE DI LIOFILIZZATO DA 1 DOSE (etichetta autoadesiva "peel-off")

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Canigen CE , liofilizzato iniettabile per cani

2. QUANTITÀ DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Virus attenuato del Cimurro $10^3 - 10^5$ DICP₅₀
Adenovirus tipo 2 attenuato $10^4 - 10^6$ DICP₅₀

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

1 dose

4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

SC

5. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

6. NUMERO DI LOTTO

LOTTO : {numero}

7. DATA DI SCADENZA

SCAD : {MM/AAAA}

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

SCATOLA DI CARTONE DA 1 DOSE

Canigen CE/L, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

Vaccino tetravalente per la prevenzione del Cimurro, Epatite infettiva e Leptospirosi nel cane

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato

Principi attivi :

Virus attenuato del Cimurro 10^3 - 10^5 D_{ICP}₅₀
Adenovirus tipo 2 attenuato 10^4 - 10^6 D_{ICP}₅₀

Il flacone liquido

Principi attivi :

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903 4350 -7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895 4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

INDICAZIONI

Canigen CE/L stimola le difese umorali ed i meccanismi di mediazione cellulare, induce nel cane un'immunità attiva duratura nei confronti del Cimurro, Epatite infettiva e Leptospirosi.

L'immunità inizia 2 settimane dopo la seconda iniezione, per una durata minima di 1 anno.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare e trasportare in frigorifero (2°C a - 8°C). Proteggere dalla luce. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dopo la ricostituzione: Utilizzare immediatamente.

OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Leggere il foglietto illustrativo

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Scatola da 1 dose

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS Cedex – FRANCIA.

Rappresentante per la vendita in Italia : VIRBAC S.r.l. - Via caldera,21 - 20153 Milano.

AIC N° 101826016

LOTTO : {numero}

SCAD : {mese/anno}

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

SCATOLA DI CARTONE DA 1 DOSE CON SIRINGA

Canigen CE/L, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

Vaccino tetravalente per la prevenzione del Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi nel cane

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 dose di vaccino contiene

flacone liofilizzato

Principi attivi :

Virus attenuato del Cimurro 10^3 - 10^5 DICP₅₀

Adenovirus tipo 2 attenuato 10^4 - 10^6 DICP₅₀

flacone liquido

Principi attivi :

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903 4350 -7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895 4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

INDICAZIONI

Canigen CE/L stimola le difese umorali ed i meccanismi di mediazione cellulare, induce nel cane un'immunità attiva duratura nei confronti del Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi.

L'immunità inizia 2 settimane dopo la seconda iniezione, per una durata minima di 1 anno

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare e trasportare in frigorifero (2°C a - 8°C). Proteggere dalla luce. Non congelare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dopo la ricostituzione: Utilizzare immediatamente.

OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI MATERIALI DI SCARTO

Leggere il foglietto illustrativo

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Scatola da 1 dose con siringa

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS Cedex – FRANCIA.

Rappresentante per la vendita in Italia : VIRBAC S.r.l. - Via caldera,21 - 20153 Milano.

AIC N° 101826042

LOTTO : {numero}

SCAD : {mese/anno}

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

scatola di cartone da 10 dosi / scatola di cartone da 30 dosi / scatola di cartone da 50 dosi

Canigen CE/L, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

Vaccino tetravalente per la prevenzione del Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi nel cane

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato

Principi attivi :

Virus attenuato del Cimurro 10^3 - 10^5 DICP₅₀
Adenovirus tipo 2 attenuato 10^4 - 10^6 DICP₅₀

flacone liquido

Principi attivi :

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903 4350 -7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895 4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

INDICAZIONI

Canigen CE/L stimola le difese umorali ed i meccanismi di mediazione cellulare, induce nel cane un'immunità attiva duratura nei confronti del Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi.

L'immunità inizia 2 settimane dopo la seconda iniezione, per una durata minima di 1 anno

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare e trasportare in frigorifero (2°C a - 8°C). Proteggere dalla luce. Non congelare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dopo la ricostituzione: Utilizzare immediatamente.

OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI MATERIALI DI SCARTO

Leggere il foglietto illustrativo

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in copia unica ripetibile.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS Cedex – FRANCIA.

Rappresentante per la vendita in Italia : VIRBAC S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano.

Scatola da 10 dosi AIC N° 101826028

Scatola da 30 dosi AIC N° 101826030

Scatola da 50 dosi AIC N° 101826055

LOTTO : {numero}

SCAD : {mese/anno}

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Canigen CE/L liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani

Vaccino tetravalente per la prevenzione del Cimurro, Epatite
Infettiva e Leptosirosi nel cane

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 CARROS Cedex – FRANCIA.

Rappresentante per la vendita in Italia : VIRBAC S.r.l. - Via caldera, 21 - 20153 Milano.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI ED ALTRI INGREDIENTI

1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato

Principi attivi :

Virus attenuato del Cimurro 10^3 - 10^5 DICP₅₀
Adenovirus tipo 2 attenuato 10^4 - 10^6 DICP₅₀

flacone liquido

Principi attivi :

Sospensione:

Leptospira interrogans inattivata:

- sierogruppo Canicola sierotipo Canicola, ceppo 601903 4350 -7330 U*
- sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierotipo Icterohaemorrhagiae, ceppo 601895 4250 - 6910 U*

*Unità ELISA di massa antigenica

INDICAZIONI

Canigen CE/L stimola le difese umorali ed i meccanismi di mediazione cellulare, induce nel cane un'immunità attiva duratura nei confronti del : Cimurro, Epatite infettiva e Leptosirosi.

L'immunità inizia 2 settimane dopo la seconda iniezione, per una durata minima di 1 anno.

CONTROINDICAZIONI

Non vaccinare durante gravidanza ed allattamento

REAZIONI AVVERSE

Nel punto d'inoculo, si può occasionalmente osservare, un piccolo e transitorio nodulo. Come per tutti gli altri vaccini, una occasionale reazione di ipersensibilità può essere osservata in alcuni animali. Se si verificasse reazione

anafilattica, instaurare rapidamente cortico-terapia (se possibile, ad alte dosi per via i.v.) o somministrare antistaminici oltre all'usuale terapia per lo shock anafilattico.

Se dovessero verificarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo si prega di informare il veterinario

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il flacone di CANIGEN[®] CE deve essere ricostituito con l'intero contenuto di CANIGEN[®] L.

Si deve somministrare l'intero contenuto del flacone ricostituito. (1ml)

Prima vaccinazione

Cuccioli a partire da 8-9 settimane di età :

Una dose per via sottocutanea di CANIGEN® CE/L seguita da un'altra dopo 3-4 settimane ma mai prima delle 12 settimane di età.

Cuccioli di età superiore alle 9 settimane :

Una dose per via sottocutanea di CANIGEN® CE/L seguita da un'altra dopo 3-4 settimane.

Richiamo

Richiamo annuale con una dose per via sottocutanea di CANIGEN® CE/L.

TEMPO DI ATTESA: Non pertinente

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il vaccino deve essere somministrato seguendo le usuali precauzioni di asepsi per la vaccinazione.

Si consiglia un trattamento antiparassitario almeno 10 giorni prima della vaccinazione. Vaccinare solo cani in buona salute. Evitare una possibile esposizione dell'animale all'infezione nei 21 giorni seguenti la vaccinazione. Il vaccino deve essere ricostituito immediatamente prima dell'uso.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con ipersensibilità accertata verso il prodotto devono evitare il contatto. Maneggiare il prodotto con attenzione al fine di evitare autoinoculazione accidentale.

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nel punto di inoculo, si può occasionalmente osservare, un piccolo e transitorio nodulo.

Come per tutti gli altri vaccini, una occasionale reazione di ipersensibilità può essere osservata in alcuni animali. Se si verificasse reazione anafilattica, instaurare rapidamente una cortico-terapia (se possibile, ad alte dosi per via i.v.) o somministrare antistaminici oltre all'usuale terapia per lo shock anafilattico.

Utilizzazione durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non vaccinare durante la gravidanza ed allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non somministrare corticosteroidi o non effettuare cure antivirali nei giorni precedenti o seguenti la vaccinazione. Non sono disponibili informazioni relative alla sicurezza ed efficacia sull'uso contemporaneo di questo prodotto con altri vaccini.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

La somministrazione di una dose 10 volte maggiore di CANIGEN® CE con una dose 2 volte maggiore di CANIGEN® L non ha provocato effetti collaterali.

Incompatibilità: In assenza di studi di compatibilità non mescolare questo prodotto con altri medicinali veterinari.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare e trasportare in frigorifero (2°C a - 8°C). Proteggere dalla luce. Non congelare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

Dopo la ricostituzione: Utilizzare immediatamente.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI SCARTO

Il medicinale veterinario non utilizzato e i materiali residui derivanti dal suo utilizzo devono essere eliminati mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo autorizzato per l'uso dell'autorità competenti.

ALTRE INFORMAZIONI

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo :
03/2019