

PER USO VETERINARIO

Cardotek-30[®] 0,068 mg tavolette masticabili per cani

Cardotek-30[®] 0,136 mg tavolette masticabili per cani

Cardotek-30[®] 0,272 mg tavolette masticabili per cani

COMPOSIZIONE

Principio attivo:

Ivermectina	0,068 mg (conf. Blu)	0,136 mg (conf. Verde)	0,272 mg (conf. Marrone)
-------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Eccipienti:

Etossichina
Butil idrossianisolo (E321)
Propil gallato

INDICAZIONI

Per la prevenzione della filariosi cardio-polmonare del cane. CARDOTEK-30 elimina le forme larvali di *Dirofilaria immitis* a localizzazione tissutale per un mese (30 giorni) dall'infestazione. CARDOTEK-30 se somministrato ad intervalli mensili (30 giorni) previene lo sviluppo delle forme adulte di *Dirofilaria repens*.

CONTROINDICAZIONI

Si raccomanda CARDOTEK-30 per cani di almeno 6 settimane di età.

POSOLOGIA, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Le tavolette masticabili di CARDOTEK-30 devono essere somministrate una volta al mese per via orale al dosaggio raccomandato di 6 µg di ivermectina per chilogrammo di peso corporeo. Lo schema di dosaggio raccomandato è il seguente:

Peso kg	Tavolette al mese	Contenuto in ivermectina per tavoletta	Colore di identificazione sulla confezione
Fino a 11	1	68 µg	Blu
da 12 a 22	1	136 µg	Verde
da 23 a 45	1	272 µg	Marrone

Per cani di peso superiore a 45 kg si consiglia di usare una combinazione appropriata dei tipi di tavolette masticabili disponibili.

Prelevare dal blister una tavoletta masticabile alla volta. Riporre il blister con le restanti tavolette masticabili nell'astuccio per proteggere il prodotto dalla luce.

Dato che la maggior parte dei cani trovano appetibili le tavolette masticabili di CARDOTEK-30, queste possono essere offerte al cane direttamente con la mano; in alternativa, possono essere aggiunte ad una piccola quantità di cibo per cani. Le tavolette devono essere somministrate in modo da incoraggiare il cane a masticare anziché ingoiare senza masticare. Le tavolette possono essere spezzate e date al cane che normalmente ingoia bocconi interi.

Prestare attenzione affinché il cane ingerisca l'intera dose ed osservare gli animali trattati per alcuni minuti dopo la somministrazione per accertarsi che parte della dose non vada perduta o espulsa. Se si ha il sospetto che parte della dose non sia stata assunta, è consigliabile ripetere la somministrazione.

CARDOTEK – 30 deve essere somministrato ad intervalli mensili durante il periodo dell'anno in cui le zanzare, vettori potenziali delle larve infestanti della filariosi, sono attive. La dose iniziale deve essere somministrata entro un mese dalla prima esposizione alle zanzare, così come la dose finale deve essere somministrata entro un mese dall'ultima esposizione.

Qualora si voglia sostituire un altro trattamento preventivo nel corso di un programma di prevenzione, la dose iniziale di CARDOTEK-30 deve essere somministrata entro un mese (30 giorni) dal termine del precedente trattamento.

Per ottenere il massimo dell'efficacia, CARDOTEK-30 deve essere somministrato una volta al mese all'incirca alla stessa data. In caso di ritardato trattamento, sia di pochi che di diversi giorni, la ripresa del trattamento con CARDOTEK-30 al regime raccomandato riduce al minimo la possibilità di sviluppo delle filarie adulte.

EFFICACIA

CARDOTEK-30, tavolette masticabili, somministrato per via orale secondo lo schema posologico raccomandato, è efficace contro le forme larvali a localizzazione tissutale di *Dirofilaria immitis* e *Dirofilaria repens* acquisite durante il mese precedente (30 giorni) e, di conseguenza, previene lo sviluppo delle forme adulte.

ACCETTABILITÀ

Nelle sperimentazioni cliniche effettuate, le tavolette masticabili di CARDOTEK-30 sono risultate essere una forma di somministrazione orale accettabile che viene consumata alla prima offerta dalla stragrande maggioranza dei cani.

INNOCUITÀ

Ricerche cliniche con CARDOTEK-30 hanno dimostrato l'esistenza di un ampio margine di sicurezza al dosaggio di ivermectina raccomandato nei cani, comprese le femmine in gravidanza, maschi e femmine da riproduzione e cuccioli di 6 settimane o più di età.

In concomitanza col programma di prevenzione con CARDOTEK-30, nelle prove cliniche sono stati impiegati vari collari anti-pulci, bagni, shampoo, prodotti antielmintici, antibiotici, vaccini e preparazioni a base di steroidi, di uso corrente.

AVVERTENZE

Prima di iniziare il trattamento con CARDOTEK-30, tutti i cani dovrebbero essere esaminati per accertare l'eventuale presenza della filariosi cardio-polmonare. Inoltre, prima di iniziare il programma di trattamento con CARDOTEK-30, i cani infestati devono essere trattati per rimuovere i vermi adulti nonché le microfilarie. CARDOTEK-30 non è efficace nei confronti degli adulti di *D. immitis*.

REAZIONI AVVERSE

Dopo il trattamento con CARDOTEK-30 il numero delle microfilarie circolanti può ridursi sino a livelli indeterminabili. Prove cliniche con ivermectina hanno messo in luce che in alcuni cani con microfilarie circolanti in seguito al trattamento possono verificarsi delle lievi reazioni di ipersensibilizzazione, in genere sotto forma di diarrea transitoria, dovute presumibilmente a microfilarie morte o morenti. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il medico veterinario.

SOVRADOSAGGIO

La somministrazione del prodotto al dosaggio consigliato ha un ampio margine di sicurezza; in collie sensibili all'ivermectina non sono state notate reazioni avverse ad un dosaggio 10 volte superiore alla dose raccomandata.

In caso di tossicità, si raccomanda un trattamento sintomatico o coadiuvante.

Tenere questo, come tutti i farmaci, fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione accidentale da parte dell'uomo, contattare immediatamente un medico.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Proteggere il prodotto dalla luce.

ISTRUZIONI PER L'USO

Condizione indispensabile per eseguire un programma di prevenzione della filariosi del cane con CARDOTEK-30 è la somministrazione mensile.

Le confezioni di CARDOTEK-30 contengono un sistema semplice per rammentare i tempi di somministrazione adeguati.

Dopo aver stabilito un idoneo programma di somministrazione col veterinario, staccare gli adesivi a forma di cuore dalla confezione e applicarli su un calendario alle date prestabilite.

Precauzioni speciali da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli appositi sistemi di raccolta per i medicinali scaduti o non utilizzati.

CONFEZIONI

CARDOTEK-30 tavolette masticabili è disponibile in confezioni per cani di peso differente:

- 1) 6 e 9 tavolette masticabili da 68 mcg di ivermectina ciascuna, per cani fino a 11 kg di peso. Banda blu
- 2) 6 e 9 tavolette masticabili da 136 mcg di ivermectina ciascuna, per cani da 12 a 22 kg di peso. Banda verde
- 3) 6 e 9 tavolette masticabili da 272 mcg di ivermectina ciascuna, per cani da 23 a 45 kg di peso. Banda marrone

Titolare A.I.C.

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Via Lorenzini 8 – 20139 Milano

Officina responsabile del rilascio dei lotti:

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

France

Data ultima revisione del foglietto illustrativo: 07/2018