



POMATA INTRAMAMMARIA
PER BOVINE IN ASCIUTTA

CEFAPIRINA BENZATINA
300 mg

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO E DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI
FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**
FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285
40064 Ozzano Emilia (BO) Italia

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
VETERINARIO**
CEFATRON ASCIUTTA, 300 mg pomata
intramammaria per bovine in asciutta.
cefapirina benzatina

**3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI
ALTRI INGREDIENTI**
1 siringa intramammaria da 5 ml contiene:
Principio attivo: cefapirina 300 mg pari a cefapirina
benzatina 390 mg - **Eccipienti** q.b. a 5 ml.

4. INDICAZIONI
CEFATRON ASCIUTTA è indicato all'atto della messa
in asciutta per la terapia delle infezioni subcliniche
esistenti e per la prevenzione di possibili mastiti
che possono insorgere durante il periodo di riposo
funzionale della mammella. Il trattamento inoltre
riduce il rischio di mastiti acute che possono
insorgere con il parto alla montata latteata.
Il trattamento deve essere effettuato al momento
della messa in asciutta e non oltre le 7 settimane
precedenti il parto.

5. CONTROINDICAZIONI
Non somministrare in animali con ipersensibilità
nota nei confronti delle cefalosporine o ad uno
degli eccipienti.
Non usare durante la lattazione.

6. REAZIONI AVVERSE
Nessuna segnalata.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o
altre reazioni non menzionate in questo foglietto
illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE
Bovine in asciutta.

**8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E
MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**
Una siringa intramammaria di Cefatron Asciutta
per quarto mammario, dopo l'ultima mungitura.
Mungere e sgocciolare a fondo ciascun quarto
mammario, quindi pulire e disinfettare i capezzoli
(in particolare l'orifizio) con idoneo preparato.
Togliere la protezione della cannula della siringa
intramammaria. Introdurre la cannula nel dotto
del capezzolo ed iniettare l'intero contenuto della
siringa intramammaria.

Sfilare la cannula, afferrare con le dita di una
mano l'estremità del capezzolo e con il pollice e
l'indice dell'altra mano spingere con delicatezza
verso l'alto il prodotto contenuto nel dotto del
capezzolo stesso.
Massaggiare quindi con delicatezza e con
entrambe le mani il quarto spingendo sempre
verso l'alto, per far diffondere uniformemente il
prodotto in tutta la cisterna.

**9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA
SOMMINISTRAZIONE**
Nessuna.

10. TEMPI DI ATTESA
Carni e visceri: 8 giorni.
Latte: zero ore (zero mungiture).

**11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA
CONSERVAZIONE**
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare il prodotto ad una temperatura non
superiore a +25°C.
Non usare dopo la data di scadenza riportata
sull'etichetta.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Accertamento anamnestico dell'eventuale ipersensibilità alle cefalosporine del soggetto da trattare.

Se possibile, il medicinale veterinario dovrebbe essere usato in base ai risultati dell'antibiogramma. Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel foglietto illustrativo può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibatterici a causa della possibile comparsa di resistenza crociata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Nessuna.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

CEFATRON ASCIUTTA va usato negli ultimi due mesi di gravidanza.

Non usare durante la lattazione.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Le cefalosporine possono presentare antagonismo nei confronti di tetracicline e macrolidi.

Sovradosaggio (sintomi, procedura di emergenza, antidoti)

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al tuo medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

10 febbraio 2017

15. ALTRE INFORMAZIONI

CEFATRON ASCIUTTA è un preparato a base di sale benzatinico di cefapirina la quale presenta un ampio spettro d'azione e la caratteristica di essere resistente alle β -lattamasi batteriche. Tra i microrganismi responsabili di mastite, la cefapirina si è dimostrata particolarmente attiva nei confronti di stafilococchi, compresi i ceppi penicillinasi produttori, *Streptococcus agalactiae* ed *uberis*, *Escherichia coli* e *Trueperella pyogenes*. CEFATRON ASCIUTTA è allestito in modo da presentare una elevata stabilità del preparato e una consistenza e fluidità costante anche alle massime temperature ambiente.

CEFATRON ASCIUTTA è ben tollerato, non irrita la mammella né comporta altri tipi di reazione.

In seguito alla somministrazione di CEFATRON ASCIUTTA, la cefapirina permane in mammella per tutto il periodo dell'asciutta e viene eliminata con la successiva montata latte.

Confezioni

Astuccio da 4 siringhe intramammarie da 5 ml

Astuccio da 12 siringhe intramammarie da 5 ml

Astuccio da 20 siringhe intramammarie da 5 ml

Astuccio da 60 siringhe intramammarie da 5 ml

Astuccio da 100 siringhe intramammarie da 5 ml

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Distributore per l'Italia:

AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. s.r.l.
40064 Ozzano Emilia (BO) Italia