

CHEMISOLE 20%
(levamisolo)
200 mg/ml
soluzione ad uso orale per polli da carne e tacchini

Indicazione dei principi attivi e di altre sostanze

Ogni ml contiene:

Principi attivi:

levamisolo mg 200

Eccipienti:

Sodio metabisolfito; altri q. b. a ml 1,00

Forma farmaceutica

Soluzione ad uso orale, da diluire nell'acqua da bere.

Confezioni

Bottiglia da 100 ml

Bottiglia da 1 L

Tanica da 5 L

Specie di destinazione

Polli da carne e tacchini.

Indicazioni

Infestioni sostenute da forme adulte e larvali di *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Syngamus trachea* e *Ascaridia galli*.

Modalità e via di somministrazione

1 ml di "Chemisole 20%" / 8-10 kg p.v. (pari a 20-25 mg di levamisolo/kg p.v.), pari a circa 50,0 – 100,0 ml/100 litri di acqua; la durata del trattamento è di un giorno (12 ore).

Posologia:

Durata indicativa del trattamento: 1 giorno (12 ore)

N.B.: Si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 14-21 giorni dal primo, al fine di colpire tutte le forme emergenti non aggredite con il primo intervento.

Indicazioni per una corretta somministrazione:

togliere dagli abbeveratoi la bevanda non medicata e somministrare quella medicata fino a completo esaurimento della stessa. Quindi ripristinare la bevanda non medicata. Sarebbe opportuno lasciare assetare gli animali per qualche ora prima di somministrare la bevanda medicata.

Tempi di attesa

Polli da carne e tacchini: carne e visceri 7 giorni.

Non somministrare ad animali produttori di uova destinate al consumo umano.

Avvertenze speciali

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Vedi controindicazioni, interazioni e reazioni avverse.

Non somministrare ad animali produttori di uova destinate al consumo umano.

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci.

Può svilupparsi resistenza da parassiti a qualsiasi particolare classe di antielmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antielmintico di quella classe.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Vedi controindicazioni, interazioni e reazioni avverse.

Qualora somministrato ad animali con diarrea, l'efficacia nei confronti delle tenie può risultare ridotta.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la sua manipolazione.

Le persone con nota ipersensibilità al levamisolo devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Utilizzare indumenti protettivi, guanti e mascherina durante la manipolazione del medicinale veterinario. Non ingerire, evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e le mucose. In caso di contatto o ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli l'etichetta. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione; lavare le mani dopo l'uso.

Controindicazioni

Evitare di somministrare il preparato ad animali con gravi compromissioni epatiche.

Reazioni avverse

Il prodotto potrebbe rivelarsi di gusto non gradevole per gli animali. I volatili che soffrono di gravi infestioni da nematodi broncopolmonari possono presentare rantoli e tosse, causati dalla rimozione dei vermi dai polmoni, che possono perdurare per parecchie ore.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informarne il veterinario.

Utilizzo durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non si applica.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Evitare la somministrazione contemporanea di antielmintici ad azione nicotinosimile (es. pyrantel tartrato).

Il levamisolo non deve essere impiegato insieme agli esteri organofosforici ed ai carbammati.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali.

Sovradosaggio

Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

Data di scadenza**SCAD:** MM/AAAA.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi

Periodo di validità dell'acqua medicata: 12 ore.

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento dei medicinali non utilizzati o dei rifiuti

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO.**Tenere fuori dalla portata dei bambini.****Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio del lotto: Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bottiglia da 100 ml: AIC N°: 102889019

Bottiglia da 1 L: AIC N°: 102889021

Tanica da 5 L: AIC N°: 102889033

Numero del lotto di fabbricazione

Lotto N°: del

Peso netto: 100 ml / 1 L / 5 L

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO
VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE.

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA
