

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER:

CONOPTAL®

1% collirio, sospensione per cani

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, DK-7171 Uldum, Danimarca

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LEO Laboratories Limited, 285 Cashel Road, IE-Dublino 12, Irlanda

Distribuito da:

Dechra Veterinary Products Srl, Via Agostino da Montefeltro, 2, IT-10134 Torino, Italia

Denominazione del medicinale veterinario:

Conoptal 1% collirio, sospensione per cani

Acido fusidico

Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti:

1 g di collirio, sospensione contiene:

Principio attivo:

Acido fusidico 10 mg

Adiuvanti:

Cloruro di benzalconio 0,11 mg

Edetato bisodico 0,5 mg

Collirio. Sospensione viscosa, sterile, di colore da bianco a bianco sporco.

Indicazioni:

Infezioni oculari nei cani causate da batteri sensibili all'acido fusidico.

Controindicazioni:

Il Conoptal non deve essere utilizzato nei casi di congiuntivite associati a *Pseudomonas* spp.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo, agli adiuvanti o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Reazioni avverse:

Si possono veri_care reazioni allergiche o di ipersensibilità nei confronti del principio attivo o degli eccipienti.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

Specie di destinazione:

Cani.

Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione:

Una goccia di Conoptal deve essere instillata in ciascun occhio due volte al giorno.

Il trattamento deve essere continuato per almeno 24 ore dopo che l'occhio è tornato alle condizioni normali. Se dopo 5 giorni di trattamento non si osservano miglioramenti, riconsultare il medico veterinario.

Avvertenze per una corretta somministrazione:

Bisogna evitare di contaminare il contenuto durante l'uso ed evitare che il beccuccio venga a contatto diretto con l'occhio.

Per evitare il trasferimento dell'infezione con il beccuccio del tubetto, trattare prima l'occhio non infetto.

Tempo di attesa:

Non pertinente.

Particolari precauzioni per la conservazione:

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul tubetto dopo Scad.

Periodo di validità dopo la prima apertura del tubetto: 1 mese.

Avvertenze speciali:

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Non usare lo stesso tubetto per trattare cani diversi.

Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Lavarsi le mani dopo l'applicazione del prodotto.

Persone con nota ipersensibilità all'acido fusidico, devono evitare il contatto con il medicinale veterinario.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti:

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i ri_uti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:

10-01-2014

Altre informazioni:

Tubetti da 3 g e 5 g.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

029010-00