



CUNIVAX MIXOMA



vaccino liofilizzato e diluente per sospensione iniettabile per conigli

TITOLARE A.I.C. E PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL LOTTO:
FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO) - Via Emilia, 285

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una dose da 0,2 ml contiene: **Principio attivo:** virus vivo attenuato della mixomatosi del coniglio, stipite Borghi, liofilizzato. Titolo: non inferiore a 10^5 DICT₅₀.

INDICAZIONI

Per l'immunizzazione attiva dei conigli per ridurre la mortalità, i sintomi e le lesioni della mixomatosi.

L'immunità inizia circa 10 giorni dopo la vaccinazione e perdura per 4-6 mesi.

CONTROINDICAZIONI - Nessuna nota.

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario

SPECIE DI DESTINAZIONE - Conigli.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La dose è di 0,2 ml per capo di qualsiasi età e taglia. La somministrazione deve avvenire per via intradermica, preferibilmente nella faccia esterna dell'orecchio. Possono essere utilizzate siringhe automatiche percutanee.

Il prodotto vaccinale deve essere ricostituito al momento dell'uso: si preleva il diluente dall'apposito flacone annesso e si omogenizza accuratamente, servendosi a tale scopo di siringa ed ago sterili (non trattati con disinfettanti).

La risospensione della massa liofilizzata con il diluente è praticamente istantanea senza residuare alcuna parte non disciolta.

SCHEMA VACCINALE

Gli animali devono essere vaccinati a partire dal 30° giorno di età. Le rimonte vanno rivaccinate precedentemente al primo accoppiamento ed i riproduttori due volte l'anno. In zone in cui la Mixomatosi è endemica o in allevamenti in cui si è manifestata la malattia, la vaccinazione dei piccoli deve essere anticipata al 25° giorno di età ed i riproduttori devono essere immunizzati 3 volte l'anno.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

CUNIVAX MIXOMA, non ancora ricostituito, va conservato in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C. Non congelare.

Una volta ricostituito il vaccino deve essere utilizzato entro 2-3 ore.



TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il vaccino va somministrato ad animali di allevamenti sani a scopo preventivo, ma può essere utilmente impiegato anche negli allevamenti colpiti da infezione, sugli animali ancora sani, specialmente se in gruppi separati da quelli colpiti dalla malattia.

TEMPI D'ATTESA - zero giorni.

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Particolari precauzioni dovranno essere prese negli allevamenti infetti per evitare la trasmissione del virus patogeno durante le operazioni di inoculazione degli animali. E' consigliabile evitare l'inoculazione a coniglie gravide per l'eventualità di aborti conseguenti alle manipolazioni e non ad un effetto diretto del vaccino che è innocuo per la gestazione.

Adottare le misure veterinarie e fitosanitarie per evitare la diffusione alle specie sensibili.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il vaccino agli animali

Persone con ipersensibilità accertata verso il prodotto devono evitarne il contatto. Maneggiare il prodotto con attenzione al fine di evitare autoinoculazione accidentale.

Uso durante la gravidanza, l'allattamento e l'ovodeposizione

E' consigliabile evitare l'inoculazione a coniglie gravide per l'eventualità di aborti conseguenti alle manipolazioni e non ad un effetto diretto del vaccino che è innocuo per la gestazione.

Interazione con altri farmaci ed altre forme di interazione

Non sono disponibili informazioni sulla compatibilità con altri vaccini, pertanto non sono state dimostrate efficacia ed innocuità di questo prodotto usato con altri.

Sovradosaggio

La somministrazione di un sovradosaggio di 2,5 volte la dose non provoca alcun effetto negativo.

Incompatibilità

Non mescolare questo prodotto con altri vaccini.

SPECIALI PRECAUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE

Eliminare i rifiuti mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo approvato per l'uso dalla autorità competenti.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 7/2011
SOLO PER USO VETERINARIO