

# Cyclo Spray<sup>®</sup> 2,45% p/p

Per bovini, ovini e suini

Clortetraciclina cloridrato

Il contenitore contiene:

Principio attivo: Clortetraciclina cloridrato. Il contenuto in principio attivo è pari al 2,45% p/p (equivalente a 3,210 g).

Eccipienti:

Colorante patent blue V (E131) 0,15% p/p (equivalente a 0,196 g)

Butano 100 68,77% p/p (equivalente a 89,920 g)

**Indicazioni:** Terapia di ferite superficiali d'origine traumatica o chirurgica contaminate da agenti sensibili alla clortetraciclina.

Il prodotto può essere utilizzato nell'ambito del trattamento di infezioni cutanee superficiali e podali, in particolare della dermatite interdigitale (zoppina, pedaina e flemmone interdigitale) dermatite digitale causate da microrganismi sensibili alla clortetraciclina.

**Controindicazioni:** Non usare in caso d'ipersensibilità alle tetraciclina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare su mammelle di bovine in lattazione se il latte è destinato al consumo umano.

**Reazioni avverse:** Raramente possono verificarsi reazioni di ipersensibilità. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

**Specie di destinazione:** Bovini, ovini e suini.

**Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione:**

Il prodotto è indicato per somministrazione topica. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Tenere il contenitore a circa 15-20 cm dalla zona da trattare; spruzzare per 3 secondi finché l'area da trattare non

risulta uniformemente colorata. In caso di infezioni podali, ripetere il trattamento dopo 30 secondi. Per la terapia di ferite superficiali d'origine traumatica o chirurgica, contaminate da agenti sensibili alla clortetraciclina si consiglia un'unica somministrazione. Per la terapia della dermatite digitale, si raccomanda una doppia somministrazione a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, una o due volte al giorno per tre giorni consecutivi. Per la terapia delle altre infezioni podali (zoppina, pedaina e flemmone interdigitale), si raccomanda una doppia somministrazione a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, una o due volte al giorno. A seconda della gravità della lesione e del grado di miglioramento, ripetere la somministrazione per 1-3 giorni.

**Tempo di attesa:** Carne e visceri: Zero giorni; Latte: Zero giorni.

Si vedano anche le controindicazioni.

**Particolari precauzioni per la conservazione:** Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: Può esplodere se riscaldato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**Avvertenze speciali:**

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** Proteggere gli occhi durante la somministrazione in prossimità della testa. Prima di somministrare il prodotto, pulire accuratamente l'area da spruzzare. Dopo la somministrazione sull'unghione, l'animale deve essere tenuto su un terreno asciutto almeno per un'ora. L'uso del prodotto deve basarsi sull'antibiogramma dei batteri isolati dall'animale. Se questo non è possibile, la terapia deve basarsi sulle informazioni epidemiologiche locali (regionali, dell'azienda in questione) in merito

alla sensibilità dei batteri target. Un impiego del prodotto diverso da quello indicato nelle istruzioni riportate nell'etichetta può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alle clortetraciline e può diminuire l'efficacia del trattamento con altre tetraciline, a causa del possibile sviluppo di resistenza crociata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: A causa del rischio di sensibilizzazione e di dermatite da contatto, evitare ogni contatto con la pelle. Quando si maneggia il prodotto, indossare sempre guanti impermeabili adatti. A causa del rischio d'irritazione oculare, evitare il contatto con gli occhi. Proteggere gli occhi e il viso. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non inalare i vapori. Somministrare in luogo aperto o sufficientemente ventilato. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. Non mangiare né fumare durante la somministrazione del prodotto. Raramente possono verificarsi reazioni di ipersensibilità.

Impiego durante la gravidanza o l'allattamento: Dopo la somministrazione cutanea del prodotto, la clortetraciclina non viene né assorbita, né escreta con il latte. Può essere impiegato in gravidanza e in allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari: Dopo la somministrazione topica dello spray, non si è riscontrato assorbimento di clortetraciclina.

Gli antibiotici somministrati per via parenterale od orale non penetrano nel derma. Pertanto ogni interazione è improbabile. Non sono disponibili dati su interazioni con altri trattamenti locali.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi

di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** Febbraio 2017.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e  
dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti  
di fabbricazione:** Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25,

5531 AE Bladel, Paesi Bassi

**Altre informazioni:** Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta  
medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

**SOLO PER USO VETERINARIO** A.I.C. n. 103184014.