

ETICHETTA ESTERNA-FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

DIAPERIDINA 0,5% - SULFADIMETOSSINA 0,5% - LIQUIDO FORMEVET

Soluzione orale per uccelli da gabbia e voliera (canarini, psittacidi, piccoli uccelli ornamentali, silvani, ecc.), colombi viaggiatori.

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 g di soluzione contiene: *principi attivi*: Sulfadimetossina 5 mg, Diaveridina 5 mg.

3. CONFEZIONE

Flacone da 25 ml.

4. INDICAZIONI

Uccelli da gabbia e voliera, colombi viaggiatori.

Infezioni sostenute da batteri e protozoi in particolare:

Patologie sostenute da Streptococchi, Klebsielle, Protei, Shigelle, Stafilococchi, Salmonelle, E. coli, Pasteurella, Haemophilus.

Infezioni da germi di irruzione secondaria associate a malattie respiratorie.

Coccidiosi.

Enteriti aspecifiche.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE (frequenza e gravità)

Non sono state evidenziate reazioni avverse. Se dovessero manifestarsi effetti collaterali gravi non menzionati in questa etichetta/foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

7. MODALITA', VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uccelli da gabbia e voliera (canarini, psittacidi, piccoli uccelli ornamentali, silvani, ecc.), colombi viaggiatori: g 1-2 (20-40 gocce) ogni 100 ml d'acqua da bere, per 5-6 giorni consecutivi. Si raccomanda di sostituire l'acqua ogni giorno. Si raccomanda di miscelare il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura. Non miscelare in mangimi solidi. Non superare le dosi consigliate.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

8. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

9. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. L'utilizzo protratto oltre la durata della terapia indicata in posologia andrebbe evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile, la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali a causa di possibili variazioni circa la sensibilità dei batteri target.

Si raccomanda di miscelare il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura. Non miscelare in mangimi solidi. Non superare le dosi consigliate. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli. Dopo l'impiego, lavare le mani con acqua corrente e sapone. In caso di malessere o ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli l'etichetta. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Conservare la confezione ben chiusa. Le persone con nota ipersensibilità a sulfadimetossina, diaveridina, sulfamidici o ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Impiego durante l'ovodeposizione

Durante il periodo riproduttivo e durante l'ovodeposizione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad altri medicinali veterinari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

10. DATA DI SCADENZA

Scad. {mese/anno}

Dopo prima apertura, usare entro 6 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione in acqua: 24 ore.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale per proteggerlo dalla luce e dall'umidità.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. SOLO PER USO VETERINARIO

VENDITA NON SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

14. TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

15. ALTRE INFORMAZIONI

**NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI
NON INIETTARE**

16. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. – Via Savona 97 – 20144 Milano – Italia

Tel: +39 02 4345891 – fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CHEMIFARMA S.p.A. – Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì – Italia

17. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 25 ml – A.I.C. n. 103473017

18. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n.

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07

GTIN: