

DROPSTIL®

Collirio



Tobramicina
3 mg/ml,
per cani e gatti

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A.,

Via dei Valtorta 48,
20127 Milano.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Vetem S.p.A.,

Lungomare Pirandello, 8
92014 Porto Empedocle (AG).

Denominazione del medicinale veterinario

DROPSTIL®, 3 mg/ml, collirio per cani e gatti.

Tobramicina.

Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti - 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Tobramicina 3 mg.

Eccipienti: Benzalconio cloruro. Acido bórico.

Altri q.b. a 1 ml.

Soluzione limpida, da incolore a giallo chiaro.

Indicazioni - Congiuntiviti e cheratocongiuntiviti sostenute da batteri sensibili alla tobramicina.

Controindicazioni - Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Reazioni avverse - Come per tutti gli antibiotici aminoglicosidici somministrati per via oculare, potrebbero occasionalmente manifestarsi reazioni di intolleranza o di ipersensibilità locali quali prurito, gonfiore palpebrale o congestione congiuntivale. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

Specie di destinazione - Cani e gatti.

Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione - Instillare nel sacco congiuntivale una o due gocce di collirio tre volte al giorno per almeno sette giorni o secondo prescrizione medico veterinaria.

Avvertenze per una corretta somministrazione

Modalità d'impiego:

- 1) strappare la ghiera di alluminio ed aprire il flaconcino in vetro;
- 2) aprire la bustina, estrarre il contagocce e tappare con esso il flacone.



Tempo di attesa - Non pertinente.

Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare i flaconi in vetro nella confezione originale.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Avvertenze speciali

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione - Usare con cautela in caso di sospette infezioni virali o micotiche. Monitorare la scomparsa dei sintomi clinici, in caso contrario rivalutare la terapia.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali - Come per tutti gli antibiotici, l'uso prolungato può favorire la crescita di microrganismi resistenti, inclusi i miceti.

Nel caso in cui la somministrazione topica di tobramicina si accompagni a trattamento sistemico con antibiotici aminoglicosidici, deve essere attentamente controllata la concentrazione sierica totale.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali - Evitare il contatto con la cute.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento - In animali gravidi, in lattazione o neonati il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del Medico Veterinario.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione - Possono verificarsi fenomeni di resistenza crociata con altri aminoglicosidi.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) - Non sono noti sintomi da sovradosaggio. Non superare le dosi indicate.

Incompatibilità - In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti - I medicinali non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo - 09/2023.

Altre informazioni

Presentazione: Flacone da 5 ml con contagocce.

La tobramicina è un antibiotico aminoglicosidico facente parte di un complesso di sostanze, definite nebramicine, prodotte da *Streptomyces tenebrarius*, molto simile dal punto di vista dell'attività farmacologica e della tossicità alla gentamicina. È attivo su una vasta gamma di patogeni oculari Gram positivi e Gram negativi, in modo particolare *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. Lo spettro antimicrobico della tobramicina è paragonabile a quello della gentamicina; comunque essa ha rivelato una migliore attività *in vivo* ed *in vitro*, in particolare contro lo *Pseudomonas* e, inoltre, presenta un effetto nefro- ed oto-tossico inferiore rispetto ad altri antibiotici aminoglicosidici.

SOLO PER USO VETERINARIO