

# ERBACOLINA® PLUS

Soluzione iniettabile



per bovini

**Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi**

**Ceva Salute Animale S.p.A.**

Viale Colleoni, 15

20864 Agrate Brianza (MB).

Officina di produzione responsabile del rilascio lotti:

**Vetem S.p.A.**

Lungomare Pirandello, 8

92014 Porto Empedocle (AG).

oppure

**Ceva Santé Animale**

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Francia.

**Denominazione del medicinale veterinario**

ERBACOLINA® PLUS soluzione iniettabile per bovini.

Soluzione limpida di colore rosso bruno.

**Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti** - 1 ml di prodotto contiene:

*Principi attivi:*

Acetilmationina mg 4,8 (pari a Metionina mg 3,75).

Cianocobalamina mg 0,5.

Acido tioctico mg 0,25.

*Eccipienti:*

Alcool benzilico mg 13,25.

Sodio solfito anidro mg 0,6.

**Indicazioni** - Epatoprotettore, epatosi di varia natura: postinfettive, gravidiche, animali ad alto rischio di epatopatie peripartali, da errori dietetici, da stress da viaggio, da crisi di ambientamento; genericamente ove si ritenga opportuna una azione epatoprotettiva o di stimolo della funzionalità epatica.

**Controindicazioni** - Non usare in caso di ipersensibilità ad uno dei principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

**Reazioni avverse** - Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate

in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**Specie di destinazione** - Bovini.

**Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione** - Per via intramuscolare profonda.

Bovini: 20 ml/capo da ripetersi per 7 volte a giorni alterni.

**Avvertenze per una corretta somministrazione** - Nessuna.

**Tempo di attesa**

Carni e visceri: zero giorni.

Latte: zero giorni.

**Particolari precauzioni per la conservazione** - Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare il medicinale nel confezionamento secondario per proteggerlo dalla luce.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

**Avvertenze speciali**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione** - Nessuna nota.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali** - Nessuna.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali**

Lavarsi le mani dopo l'uso. Se il prodotto viene a contatto con la pelle o gli occhi sciacquare con abbondante acqua.

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento** - Il medicinale può essere utilizzato in gravidanza e in lattazione.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione** - Nessuna nota.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)** - Il medicinale ha un ampio margine di sicurezza ed è ben tollerato anche a dosaggio doppio (40 ml/capo) rispetto a quello indicato.

**Incompatibilità** - In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti** - I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

**Altre informazioni**

**Presentazioni:** Scatola con 1 flacone da 100 ml.

**SOLO PER USO VETERINARIO**