

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

ZFSC3360\_006 R2

**ESTROPILL**®

92 µg/ml gocce orali

Soluzione per gatte

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.

Via Nettunense Km 20.300 - 04011 Aprilia (LT)

Concessionario esclusivo per la vendita:

MSD Animal Health S.r.l.

Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI)

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

ESTROPILL 92 µg/ml gocce orali, soluzione per gatte.

Megestrol acetato.

**3. INDICAZIONI DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml contengono:

**Principio attivo:**

Megestrol acetato 9,2 mg

Soluzione orale limpida incolore.

**4. INDICAZIONE(I)**

Prevenzione del calore nella gatta.

**5. CONTROINDICAZIONI**

Il prodotto non deve essere impiegato:

- nei soggetti che presentano ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;
- nei soggetti sessualmente immaturi;
- nelle femmine gravide o con disfunzioni/infezioni della sfera genitale;
- nelle femmine affette da neoplasie mammarie;
- nei soggetti diabetici;

- nei soggetti che presentano manifestazioni di calore.

Il suo impiego, inoltre, è sconsigliato nei soggetti destinati alla carriera riproduttiva.

## 6. REAZIONI AVVERSE

A seguito di somministrazioni troppo prolungate, è possibile la comparsa di: aumento dell'appetito e del peso corporeo, ridotta tolleranza al glucosio, letargia o depressione, ipertrofia mammaria, endometrite ghiandolare cistica, piometra.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatte.

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.

Estropill gocce si può mescolare ai normali cibi del gatto, purchè tiepidi, alla dose giornaliera di 5 gocce per ogni kg di peso vivo. La cura può essere prolungata al massimo per 365 giorni consecutivi, un secondo ciclo di cura può essere ripetuto trascorsi tanti giorni quanti sono stati quelli di trattamento.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le gocce possono essere somministrate come tali o mescolate ad un po' di cibo.

## 10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Proteggere dalla luce.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 30 giorni se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## 12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza.

Gravidanza e allattamento:

Il prodotto non va somministrato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

## Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

## 13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivanti da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## 14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Ottobre 2018.

## 15. ALTRE INFORMAZIONI

Estropill gocce è costituito da uno dei più potenti e più recenti progestinici di sintesi, attivo, a piccolissime dosi, per via orale.

L'azione del principio attivo viene esercitata a livello delle ovaie impedendo la maturazione dell'ovulo e, quindi, la sua disponibilità per la fecondazione. Inoltre, inibendo la secrezione degli estrogeni naturali evita l'insorgenza di tutte quelle manifestazioni, così fastidiose, che accompagnano il calore della gatta.

Estropill gocce deve essere somministrato quotidianamente per mantenere l'animale in una fase di quiescenza sessuale (anestro). L'effetto inizia a partire dal 10° giorno e perdura per tutta la durata del trattamento ed oltre. La comparsa del calore ha luogo, dopo la sospensione della somministrazione, entro periodi variabili che sono anche in relazione alla durata globale della cura. Esperienze pratiche effettuate su numerosi soggetti hanno dimostrato che, con una cura di 365 giorni, il successivo calore può ricomparire nel periodo compreso tra l'80° ed il 140° giorno dalla sospensione della somministrazione di Estropill.

In caso di periodi di cura meno prolungati il calore compare entro lassi di tempo più brevi dopo la sospensione.

Confezioni:

Flacone contagocce da 30 ml

Flacone contagocce da 100 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

