



# FATROXIMIN<sup>®</sup>

P E S S A R I E F F E R V E S C E N T I

per bovine, bufale e cavalle non destinate alla  
macellazione per il consumo umano

USO VETERINARIO

## 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO), Italia

## 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

FATROXIMIN pessari effervescenti, per bovine, bufale e cavalle non destinate alla macellazione per il consumo umano (non DPA). Rifaximina 300 mg.

## 3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Un pessario contiene: **Principio attivo:** rifaximina 300 mg - **Eccipienti** q.b. a 4 g.

## 4. INDICAZIONI

FATROXIMIN pessari effervescenti è indicato per la terapia e prevenzione delle infezioni batteriche degli organi genitali femminili: metriti, endometriti, cerviciti, vulvovaginiti, forme settiche da parto, ritenzione della placenta, prolassi antiinfettiva dopo interventi ostetrici manuali o strumentali (parti distocici).

## 5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare in animali con ipersensibilità nota alla rifaximina.

## 6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovine, bufale e cavalle non destinate alla macellazione per il consumo umano.

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

FATROXIMIN pessari effervescenti va somministrato per via vaginale-uterina, secondo la seguente posologia: metriti, endometriti, cerviciti: 4 pessari in una unica somministrazione o 2+2 pessari a distanza di 24 ore; vulvovaginiti: 1+1 pessario a distanza di 24 ore; ritenzione di placenta: 4 pessari in una unica somministrazione. Qualora entro 12-24 ore dal trattamento non si verificasse il completo distacco della placenta, è consigliabile introdurre in utero altri 2 pessari; interventi ostetrici manuali o strumentali (parti distocici): 2 pessari in una unica somministrazione.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE - Nessuna.

## 10. TEMPI DI ATTESA

**Bovine - Carni e visceri:** 0 giorni - **Latte:** 0 giorni.

**Bufale - Carni e visceri:** 0 giorni - **Latte:** 72 ore (6 mungiture).

**Cavalle** - Non pertinente. **Il prodotto non deve essere somministrato a cavalle allevate a scopo alimentare. Per cavalle non destinate alla macellazione per il consumo umano.**



---

## 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Periodo di validità per il medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto conservato in confezionamento integro e correttamente conservato.

## 12. AVVERTENZE SPECIALI

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Il prodotto non deve essere somministrato a cavalle allevate a scopo alimentare.

Per cavalle non destinate alla macellazione per il consumo umano.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Nessuna.

### Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Da impiegarsi nel periodo del puerperio.

L'impiego di FATROXIMIN pessarî effervescenti non è controindicato in lattazione.

### Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti), se necessario

Non sono segnalati casi di sintomi in seguito ad iperdosaggio.

### Incompatibilità

Nessuna.

## 13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## 14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO - giugno 2008

## 15. ALTRE INFORMAZIONI

FATROXIMIN pessarî effervescenti è un preparato a base di rifaximina, antibiotico di sintesi, appartenente alla famiglia delle ansamicine.

Il meccanismo d'azione della rifaximina si esplica mediante interazione con RNA polimerasi DNA dipendente con conseguente blocco della sintesi proteica.

Lo spettro d'azione della rifaximina comprende principalmente i batteri Gram-positivi, inclusi gli anaerobi (Streptococchi, Stafilococchi, Actinomiceti, Clostridi, Bacteroidi, Fusobatteri) ed alcuni Gram-negativi.

Gli studi di farmacocinetica rilevano un passaggio nullo attraverso la parete uterina, permettendo così l'ottima disponibilità della rifaximina a livello dell'utero e l'assenza di residui nel latte e nelle carni.

### Confezioni:

Astuccio da 12 pessarî

Astuccio da 12 pessarî + guanti a perdere

Astuccio da 36 pessarî

Astuccio da 36 pessarî + guanti a perdere

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.