

# GLUCANTIME

## Antimoniato di N-metilglucamina Soluzione iniettabile per cani Solo per uso veterinario

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Via Lorenzini 8 – 20139 Milano

### Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

Meril - 4 Chemin du Calquet - 31000 Tolosa - Francia.

### Denominazione del medicinale veterinario

GLUCANTIME, 300 mg/ml soluzione iniettabile per cani

### Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti

100 ml di soluzione contengono:

#### Principio attivo:

Antimoniato di N-metilglucamina.....30 g

#### Eccipienti:

Sulfito di sodio

Androsulfito di potassio

Acqua p.p.i..... q.b. a 100 ml

**Indicazione(i):** Trattamento sintomatico della Leishmaniosi canina.

**Controindicazioni:** Non usare in caso di grave insufficienza epatica, renale o cardiaca.

**Reazioni avverse :** I rischi d'intolleranza all'antimonio sono assai rari nel cane; tuttavia è preferibile iniziare il trattamento con una posologia ridotta della metà per raggiungere progressivamente la dose utile. Una terapia prolungata può provocare epatotossicità.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**Specie di destinazione:** Cani

### Posologia via(e) e modalità di somministrazione

Vie di somministrazione: intramuscolare profonda, endovenosa lenta.

Posologia: da 200 a 300 mg/kg (da 0,6 a 1 ml/kg) cioè:

da 5 a 10 ml per un cane di 5 - 10 kg

da 10 a 15 ml per un cane di 10 - 20 kg

da 15 a 20 ml per un cane di oltre 20 kg

Praticare 20 iniezioni a 2 - 3 giorni di intervallo.

### Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dalla luce.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Non usare dopo la data di scadenza

# GLUCANTIME

riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

## **Avvertenze speciali**

**Precauzioni speciali per l'impiego:** Dato il rischio di intolleranza all'antimonio, è consigliabile iniziare il trattamento con dosi più ridotte, raggiungendo progressivamente la dose piena. In corso di trattamento va tenuta sotto controllo la funzionalità epatica, renale e cardiaca. Al fine di garantire una terapia appropriata si consiglia di consultare la linea guida su diagnosi, stadiazione, terapia, monitoraggio e prevenzione del gruppo di studio sulla Leishmaniosi canina (G.S.L.C.).

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** Può svilupparsi resistenza durante il trattamento dei cani infetti. In caso di ridotta funzionalità renale si consiglia di iniziare il trattamento con dosi inferiori (5 ml per un cane di 13-15 kg p.v).

La Leishmaniosi è una zoonosi quindi trasmissibile all'uomo e agli animali.

Il trattamento con questo prodotto riduce i segni clinici della malattia, ma non determina la guarigione parassitaria. Per questo motivo il cane può costituire una riserva di parassiti per il flebotomo (insetto vettore che diffonde la malattia). In caso di ricaduta il trattamento deve essere ripetuto.

Non superare le dosi consigliate

In caso di intolleranza bisogna sospendere il trattamento per riprenderlo a dosi più basse.

È consigliabile monitorare la creatinina e la proteinuria durante il trattamento.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:** Nessuna

**Impiego durante la gravidanza e l'allattamento:** Può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** Nessuna conosciuta.

**Sovradosaggio (simptomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Dati non disponibili – Nessun antidoto conosciuto in caso di sovradosaggio.

**Incompatibilità:** Non miscelare con altri medicinali veterinari.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** 04/2018

**Altre informazioni**

**Confezioni**

Scatola da 5 fiale da 5 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile**