

(Foglio illustr)

IMMITICIDE

Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile, per il trattamento della Filariosi cardiopolmonare del cane

COMPOSIZIONE

FLACONE LIOFILIZZATO

Principio attivo

- Dicloridrato di Melarsomina (pari a 42,75 mg di Melarsomina) 50,00 mg

FLACONE SOLVENTE

Acqua p.p.i. 2 ml

INDICAZIONI

Trattamento della Filariosi cardiopolmonare (FCP) sostenuta da *Dirofilaria immitis*.

SPECIE DI DESTINAZIONE: **cani**

CONTROINDICAZIONI

- In assenza di dati specifici sulla cagna non utilizzare il prodotto in corso di gestazione e allattamento.
- Dirofilariosi molto grave (sindrome della vena cava): è necessario un precedente trattamento chirurgico.

REAZIONI AVVERSE

- E' possibile rilevare una reazione edematosa locale, accompagnata talvolta da dolorabilità e da anoressia transitoria che scompaiono spontaneamente nel giro di 1-2 giorni.
- Eccezionalmente alcuni animali reagiscono alla dolorabilità lombare con agitazione o con altre alterazioni comportamentali della durata di alcune ore.
- Dopo circa 4-7 giorni dal trattamento, in particolare nelle forme più gravi di infestazione, si possono osservare sintomi di febbre, anoressia e depressione riferibili ad una flogosi polmonare reattiva alle filarie morte.
- Dopo circa 7-20 giorni dal trattamento, in particolare nelle forme più gravi, il tromboembolismo associato alla morte delle filarie può determinare affaticamento, depressione, anoressia e/o polipnea e dispnea che devono essere oggetto di un controllo e di un trattamento specifico.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

INTERAZIONE CON ALTRI MEDICINALI

Nessuna nota.

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- Via di somministrazione: iniettare rigorosamente per via intramuscolare profonda, nei muscoli lombari fra L₃ e L₅
- Preparazione della soluzione iniettabile: aggiungere 2 ml di solvente al flacone di polvere liofilizzata da 50 mg per ottenere così una soluzione al 2,5%
- Posologia: in funzione delle classi cliniche (vedi tab. 1 e 2)
 - * 2,5 mg/kg p.v., 2 volte a distanza di 24 ore cioè 1,0 ml/10 kg p.v., 1 volta al giorno per 2 giorni

AVVERTENZE

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Per evitare qualsiasi imprecisione di posologia è opportuno pesare l'animale e misurare esattamente il volume di soluzione da iniettare.

Al momento dell'inoculazione nei muscoli lombari assicurarsi una buona contenzione dell'animale. In caso di iniezione accidentale sottocutanea, nel tessuto adiposo o nelle fasce intermuscolari può comparire un edema transitorio più o meno evidente.

La somministrazione del prodotto deve essere preceduta da una attenta valutazione della funzionalità epatica e renale.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Si consiglia particolare attenzione nella preparazione e somministrazione del prodotto. In caso di autoinoculazione accidentale o contatto, consultare immediatamente un medico.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

In assenza di studi specifici sulla cagna, non utilizzare il prodotto in corso di gestazione e allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti), se necessario

In caso di sovradosaggio accidentale di Melarsomina, l'immediata somministrazione di Dimercaprol (BAL) alla dose di 3 mg /kg p.v. intramuscolare per una sola volta, si è dimostrata in grado di impedire l'instaurarsi di fenomeni tossici.

CONSERVAZIONE

- Lontano da fonti di calore ed in luogo asciutto.
- La soluzione al 2,5% estemporanea può essere riutilizzata nelle 24 ore se conservata tra +2°C e +8°C, al riparo dalla luce.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE VETERINARIO NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL SUO UTILIZZO

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivanti da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti

CONFEZIONI

- Scatola da 5 flaconi da 50 mg + 5 flaconi di solvente da 2 ml
A.I.C. n. 101337018 del Ministero della Salute

**DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA
IN COPIA UNICA NON RIPETIBILE**

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

PER USO VETERINARIO

Titolare dell'autorizzazione immissione in commercio :

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Via Lorenzini 8 – 20139 Milano

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Merial, 4 Chemin du Calquet, 31300 - Tolosa (Francia)

ALTRE INFORMAZIONI

IMMITICIDE è un composto arsenicale trivalente.

La Melarsomina esercita una potente e completa attività nei confronti della *Dirofilaria immitis* dalle forme immature (L5) al parassita adulto.

Nei giorni che seguono il trattamento si apprezza un rapido miglioramento clinico ed in particolare una marcata riduzione dell'ipertensione polmonare ben evidenziata anche mediante ecocardiografia Doppler.