

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

# Intubeaze 20 mg/ml

Spray laringofaringeo, soluzione per gatti

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi

**PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Regno Unito

Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Intubeaze 20 mg/ml spray laringofaringeo, soluzione per gatti  
Lidocaina cloridrato monoidrato

**INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Principio attivo: Lidocaina cloridrato monoidrato 20 mg/ml (equivalente a lidocaina 16,2 mg/ml)

Eccipiente: Clorocresolo 1 mg/ml

Liquido trasparente incolore.

**INDICAZIONE**

Anestesia locale della mucosa laringea del gatto allo scopo di facilitare l'intubazione endotracheale impedendo la stimolazione del riflesso laringeo.

**CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare in animali ipovolemici o che mostrano blocco cardiaco. Non utilizzare in casi accertati di ipersensibilità nei confronti del principio attivo o di uno o più eccipienti.

**REAZIONI AVVERSE**

Nessuna conosciuta.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE**

Gatti.

**POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Per uso laringofaringeo.

Spruzzare una o due volte sul retro della gola. Ogni spruzzo (circa 0,14 ml) contiene circa 2,8 g di lidocaina cloridrato monoidrato, che corrisponde a 2,27 mg di lidocaina. Ogni spruzzo (0,14 ml) contiene 2,8 mg di lidocaina cloridrato monoidrato, corrispondente a 2,27 mg di lidocaina.

Attendere 30-90 secondi prima di intubare, in modo che la laringe si sia rilassata.

Rimuovere il dispositivo di spruzzo dalla pompa spray tenendolo verticalmente e non angolato per non danneggiare il perno.

**AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Prima di utilizzare il prodotto, innescare la pompa fino all'uscita del liquido. Si consiglia un minimo di 4 spruzzi per innescare il flacone prima di utilizzare il prodotto e almeno 2 spruzzi per il riadescamento innescare se non si utilizza il prodotto da 7 o più giorni.

**TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

**PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola dopo SCAD.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Una volta aperto, usare entro 3 mesi.

## **AVVERTENZE SPECIALI**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Utilizzare con attenzione in caso di insufficienza epatica o cardiaca.

Si consiglia di sterilizzare a freddo l'ugello tra un paziente e l'altro per evitare la diffusione di infezione.

La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

- Lidocaina e clorocresolo possono scatenare reazioni (allergiche) di ipersensibilità. Gli individui con accertata ipersensibilità verso queste sostanze devono evitare il contatto con questo prodotto.
- L'esposizione accidentale a questo prodotto può provocare effetti locali come paralisi ed effetti sistemici come vertigini o sonnolenza. Evitare l'esposizione accidentale, in particolare orale, oculare e l'esposizione all'inalazione.
- Indossare guanti durante la movimentazione del prodotto e lavare tutte le aree esposte dopo l'uso. In caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare con acqua.
- In caso di reazioni gravi o estese, contattare un medico e mostrargli l'etichetta del prodotto.
- La lidocaina può formare metaboliti mutageni e genotossici negli esseri umani. Questi metaboliti possono anche indurre, come da studi tossicologici a lungo termine sui ratti, effetti cancerogeni ad alte dosi.

Gravidanza e allattamento:

Studi di laboratorio sui topi hanno mostrato effetti fetotossici ad alte dosi.

Nessuno studio sulla sicurezza del prodotto è stato condotto su gatte in gravidanza.

Da utilizzare da parte del veterinario responsabile soltanto dopo aver valutato il rapporto beneficio/rischio.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Nessuna conosciuta.

Incompatibilità:

Non pertinente.

## **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

I medicinali non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

06/2019

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Quantità della confezione: 10 ml.

A.I.C. n. 105177012