

# IODIOJET®

Soluzione iniettabile



Sodio ioduro

**200 mg/ml  
per bovini**

**Composizione** - 100 ml contengono: principio attivo: sodio ioduro 20 g; eccipienti q.b. a 100 ml.

IODIOJET® è caratterizzato dalla presenza, come principio attivo, di sodio ioduro.

Lo iodio è un elemento minerale fondamentale per la funzionalità tiroidea ed un componente essenziale della dieta alimentare dell'uomo e degli animali. La sua carenza porta allo sviluppo della sindrome da ipotiroidismo.

Lo iodio inorganico oltre ad avere un blando effetto battericida, ne esercita uno benefico sui processi proliferativi cronici, riducendo la reazione granulomatosa dei tessuti.

Lo iodio somministrato nella dieta agli animali ruminanti, sotto forma di sali di sodio o di potassio o di sali organici, viene escreto con il latte, oltre che con le urine, in quantità proporzionale alla dose somministrata.

**Specie di destinazione** - Bovini.

**Indicazioni** - Trattamento dei granulomi infettivi: nelle varie forme di actinomicosi ed actinobacillosi della lingua, della laringe, della faringe, della cute e del connettivo sottocutaneo dei bovini (ad esclusione delle bovine in lattazione).

**Controindicazioni** - Non somministrare ad animali gravidi, in lattazione e con ipertiroidismo.

**Effetti indesiderati** - Irrequietezza, dispnea, tachicardia. Tali reazioni sono state registrate in rare occasioni dopo somministrazione endovena di iodio.

**Modo d'impiego e posologia** - Per via endovenosa lenta (avere cura di evitare una somministrazione perivascolare accidentale). 15 ml/50 kg di peso vivo. Ripetere dopo 10-14 giorni.

**Tempo di sospensione** - Carni: 14 giorni. Non usare in bovine in lattazione.

**Avvertenze** - Somministrare con cautela in quanto la sensibilità degli animali verso i composti di iodio può variare da soggetto a soggetto. Interrompere il trattamento

non appena dovessero comparire effetti indesiderati. In mancanza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali.

## **Sovradosaggio**

Possibili sintomi di iodismo.

## **Particolari precauzioni per la conservazione**

- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Proteggere dalla luce. Da consumare immediatamente dopo l'apertura.

Scartare il prodotto eventualmente non utilizzato. Non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

## **Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei materiali di scarto**

- Il medicinale veterinario non utilizzato o i materiali di scarto devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

## **Data di revisione del foglio illustrativo**

09/2023

**Presentazioni** - Flacone da 100-200 ml.

## **SOLO PER USO VETERINARIO**

Titolare A.I.C.:

**Ceva Salute Animale S.p.A.**

Via dei Valtorta 48, 20127 Milano.

Officina produzione e rilascio lotti:

**Vetem S.p.A.**

Lungomare Pirandello 8

92014 Porto Empedocle (AG)

**Ceva Santé Animale**

10 av. de la Ballastière

33500 Libourne, Francia.