

MEGABRON® 959 mg/g

Granuli microincapsulati ad uso orale per equini TEOFILLINA

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

ACME s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE)

Titolare dell'Autorizzazione alla Produzione

Eurand S.p.A. - via Martir Luther King, 13 - 20060 Pessago con Bornago (MI)

Titolare dell'Autorizzazione al Confezionamento finale Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

ACME DRUGS s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9/A - 42025 Cavriago (RE)

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Un g di granuli microincapsulati contiene:

Principio attivo

Teofillina anidra: 959 mg

INDICAZIONI

Terapia degli stati broncospastici reversibili associati a bronchite acuta, bronchite cronica, bronchite cronica ostruttiva (C.O.P.D.), enfisema polmonare, enfisema polmonare cronico (c.d. borsaggine), e dei sintomi ad essi correlati: tosse, dispnea, facile affaticabilità; terapia delle broncopolmoniti acute e croniche e del cuore polmonare.

Nella profilassi delle patologie respiratorie su base allergica la somministrazione di MEGABRON dovrebbe precedere il contatto con gli allergeni (polveri, muffe, pollini ecc.).

CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali con ipersensibilità nota al principio attivo e ai derivati xantini in genere o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE

Con l'impiego di teofillina a dosaggi elevati possono manifestarsi tachicardia, extrasistolie, tachipnea, eccitabilità, nausea, vomito.

Occasionalmente può comparire iperglicemia.

La comparsa di reazioni avverse può richiedere la sospensione del trattamento che, a giudizio del medico veterinario, potrà essere ripreso alla scomparsa delle stesse, ma a dosaggi inferiori.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Equini

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: orale

Posologia:

La posologia di MEGABRON deve essere rapportata al peso dell'equino: la posologia media consigliata è di 5-10 mg di principio attivo per kg di peso corporeo.

Cavalli: da 0,5 a 1,5 bustine ogni 12 ore secondo il peso e la gravità della patologia.

Puledri: da 0,25 a 1 busta ogni 12 ore secondo il peso e la gravità della patologia.

Nei soggetti più giovani non superare la dose di 10 mg per kg di peso.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Miscelare accuratamente alla razione

TEMPO DI ATTESA

Carne e visceri: zero giorni

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Fattori quali l'età, la disfunzione epatica e/o renale, lo scompenso cardiaco congestizio, le affezioni ostruttive croniche del polmone, le infezioni concomitanti, e la contemporanea somministrazione di eritromicina, lincomicina e clindamicina, allopurinolo, cimetidina, possono indurre una riduzione della clearance della teofillina.

I depressori del SNC quali la fenitoina aumentano fino al doppio del suo valore la clearance della teofillina.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

La teofillina non dovrebbe essere somministrata contemporaneamente ad altri preparati xantini; cautela richiede l'associazione tra teofillina ed efedrina o altri simpaticomimetici broncodilatatori. Il prodotto deve essere somministrato con prudenza nei soggetti anziani, cardiopatici, ipertesi e negli animali con grave ipossiemia, ipertiroidismo, cuore polmonare cronico, insufficienza cardiaca congestizia, ulcera peptica e nei soggetti con gravi malattie renali ed epatiche. Non superare le dosi raccomandate se non sotto il diretto controllo di un medico veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con nota ipersensibilità alla teofillina devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Non ingerire. In caso di ingestione accidentale rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

La teofillina ha interazioni farmacologiche con alcuni antibiotici quali eritromicina, lincomicina, clindamicina, allopurinolo, cimetidina, con depressori del SNC quali fenitoina e diazepam, con preparati xantini, con efedrina e con altri simpaticomimetici broncodilatatori.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Con l'impiego di teofillina a dosaggi elevati possono manifestarsi tachicardia, extrasistolie, tachipnea, eccitabilità, nausea e vomito.

In caso di sovradosaggio, con raggiungimento di livelli plasmatici superiori a 20 mcg/ml, possono comparire crisi convulsive generalizzate tonico-cloniche ed aritmie ventricolari gravi.

Gli effetti convulsivi causati dall'intossicazione di teofillina possono essere trattati con somministrazione i.v. di diazepam o di fenitoina che accorciano l'emivita della teofillina e ne aumentano la clearance ad un valore pressoché doppio.

Incompatibilità

Non somministrare MEGABRON contemporaneamente ad altri preparati xantini.

Impiegare cautela nel trattamento concomitante di efedrina o di altri simpaticomimetici broncodilatatori.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: Settembre 2011