

**4 MG/10 MG, COMPRESSE RIVESTITE PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA E GATTINI**  
**16 MG/40 MG, COMPRESSE RIVESTITE PER GATTI**  
 Milbemicina ossima, Praziquantel

■ **NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI:**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: VIRBAC - 1<sup>re</sup> avenue - 2065 m - LID - 06516 Carros - FRANCIA

■ **INDICAZIONE DEI PRINCIPII ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI:**

Ogni compressa contiene: Ingredienti attivi:

	Aspetto	Milbemicina ossima	Praziquantel
<b>Milpro Vet 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini</b>	Compresse ovali, marrone scuro, al sapore di carne con una tacca su entrambi i lati.	4 mg	10 mg
<b>Milpro Vet 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti</b>	Compresse ovali, da rosse a rosa, al sapore di carne, con una tacca su entrambi i lati.	16 mg	40 mg

Le compresse possono essere divise a metà.

■ **INDICAZIONI:** Nei gatti: trattamento di infezioni miste causate da cestodi immaturi e adulti (platelminti) e nematodi adulti (nematelminti) delle seguenti specie:

Cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*,

Nematodi: *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*

Il prodotto può essere anche utilizzato per la prevenzione della filariosi cardiaca (*Dirofilaria immitis*), se è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

■ **CONTROINDICAZIONI:**

<b>Milpro Vet 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini</b>	<b>Milpro Vet 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti</b>
Non usare nei gattini di età inferiore a 6 settimane e/o di peso inferiore a 0,5 kg.	Non usare nei gatti di peso inferiore ai 2 kg.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o a uno degli altri principi.

Si veda anche il paragrafo "AVVERTENZE SPECIALI".

■ **REAZIONI AVVERSE:** In rarissimi casi, in particolare nei gatti giovani, dopo la somministrazione del medicinale veterinario si possono osservare segni sistemici (letargia), segni neurologici (atassia e tremori muscolari) e/o segni gastrointestinali (emesi e diarrea).

Se si notano effetti gravi o altri effetti non riportati nel presente foglietto illustrativo, informare il medico veterinario.

■ **SPECIE DI DESTINAZIONE:**

Gatti.

■ **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:**

Secondo la buona pratica veterinaria, per garantire un dosaggio preciso gli animali devono essere pesati.

Uso orale.

Dosaggio minimo raccomandato: 2 mg di milbemicina ossima e 5 mg di praziquantel per kg da somministrare

una volta al giorno, per via orale, in una singola dose.

Il prodotto deve essere somministrato con il cibo o dopo l'assunzione di cibo.

Il prodotto consiste in una compressa di dimensioni ridotte.

Per facilitare la somministrazione il prodotto è stato rivestito al sapore di carne.

Le compresse possono essere divise a metà.

A seconda del peso del gatto, il dosaggio è il seguente:

Peso	<b>Milpro Vet 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini</b>	<b>Milpro Vet 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti</b>
0,5 - 1 kg	1/2 compressa	
> 1 - 2 kg	1 compressa	
2 - 4 kg		1/2 compressa
> 4 - 8 kg		1 compressa
> 8 - 12 kg		1 + 1/2 compresse

Se si utilizza un trattamento per la prevenzione della filariosi cardiaca e allo stesso tempo è richiesto un trattamento contro la tenia, il prodotto può sostituire il prodotto monovalente per la prevenzione mensile della filariosi cardiaca.

■ **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE:** Non applicabile.

■ **TEMPO DI ATTESA:** Non applicabile.

■ **PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE:** Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Le mezzette compresse devono essere conservate nel blister originale e utilizzate per la somministrazione successiva.

Tenere il blister nell'imballaggio esterno. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza

riportata sulla scatola e sul blister dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi.

■ **AVVERTENZE SPECIALI:**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:** Si raccomanda di trattare contemporaneamente tutti gli animali che vivono nella stessa famiglia. Per sviluppare un programma di controllo efficace della verminosità, occorre tenere in considerazione le informazioni epidemiologiche locali e le condizioni di vita del gatto. Di

conseguenza si raccomanda di richiedere il consulto di un veterinario. La resistenza ad una classe particolare di

antelmintici può svilupparsi a seguito di un utilizzo frequente e ripetuto di un antelmintico appartenente a

quella classe. Quando è presente un'infezione da *D. caninum*, per prevenire una re-infezione occorre considerare

un trattamento concomitante contro gli ospiti intermedi, come pulci e pidocchi.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** Non sono stati eseguiti studi su gatti seriamente debilitati o soggetti

con funzionalità renale o epatica gravemente compromesse. Il prodotto non è raccomandato in questi animali oppure

soltanto dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio eseguita dal veterinario responsabile.

Dagli studi risulta che il trattamento dei cani con un numero elevato di microfilarie che circolano nel sangue può

talvolta provocare reazioni di ipersensibilità, come mucose pallide, vomito, tremore, respiro affannoso o

salivazione eccessiva. Queste reazioni sono associate al rilascio di proteina da parte delle microfilarie morte o

morenti e non sono un effetto tossico diretto del prodotto. Di conseguenza, l'uso nei cani che presentano

microfilaria non è raccomandato. In assenza di dati sui gatti affetti da microfilaria, il suo utilizzo deve essere

previsto dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio eseguita dal veterinario responsabile.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:**

Lavarsi le mani dopo l'uso. In caso di ingestione accidentale delle compresse, in particolare da parte di un

bambino, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

**Gravidanza e allattamento:** In uno studio, è stato dimostrato che questa combinazione di principi attivi era ben

tollerata nelle femmine riproduttrici, anche durante la gravidanza e l'allattamento. Poiché non è stato realizzato

uno studio specifico su questo prodotto, utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento soltanto dopo

un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio eseguita dal veterinario responsabile

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** L'uso concomitante della combinazione

praziquantel/milbemicina ossima con la selamectina è ben tollerata. Non si sono osservate interazioni dopo

somministrazione della dose raccomandata del lattone macrociclico selamectina durante il trattamento con la

combinazione alla dose raccomandata. In assenza di ulteriori studi, si deve prestare attenzione nel caso di uso

concomitante del prodotto e di altri lattoni macrociclici. Non sono stati condotti studi di questo tipo in animali

da riproduzione.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):** In uno studio condotto sul prodotto somministrato alla

dose terapeutica 1X, 3X e 5X e per una durata che supera l'indicazione terapeutica, cioè 3 volte a intervalli di

15 giorni, segni non comunemente osservati alla dose raccomandata (si veda il paragrafo "REAZIONI AVVERSE")

sono stati osservati a 5 volte la dose terapeutica dopo il secondo e il terzo trattamento. Questi segni sono

scomparsi spontaneamente dopo un giorno.

■ **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O**

**DEGLI EVENTUALI RIFIUTI:**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in

conformità alle disposizioni di legge locali.

Il prodotto non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri

organismi acquatici.

■ **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:** Novembre 2014

■ **ALTRE INFORMAZIONI:**

Confezioni disponibili:

**Milpro Vet 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini:**

1 confezione da 2 compresse contenente 1 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

1 confezione da 4 compresse contenente 2 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

1 confezione da 24 compresse contenente 12 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

**Milpro Vet 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti:**

1 confezione da 2 compresse contenente 1 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

1 confezione da 4 compresse contenente 2 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

1 confezione da 24 compresse contenente 12 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

1 confezione da 48 compresse contenente 24 blister con 2 compresse (compresse divisibili)

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.