Virbac

MILPRO® Vet
2,5 mg / 25 mg
12,5 mg / 125 mg

2,5MG/25MG, COMPRESSE RIVESTITE PER CANI DI PICCOLA TAGLIA E CUCCIOLI
12,5MG/125MG, COMPRESSE RIVESTITE PER CANI
Milbemicina ossima, Praziquantel

■ **NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI:** Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: VIRBAC - 1ère avenue - 2065 m - LID - 06516 Carros - FRANCIA

■ **INDICAZIONI DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI:** Ogni compressa contiene: Principi attivi:

	Aspetto	Milbemicina ossima	Praziquantel
Milpro Vet 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli	Compresse di forma ovale, da beige a marrone chiaro, aromatizzate a base di carne con una tacca divisoria su entrambi i lati. Le compresse possono essere divise in due metà.	2,5 mg	25,0 mg
Milpro Vet 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani	Compresse rotonde rivestite per cani.	12,5 mg	125,0 mg

■ **INDICAZIONI:** Nei cani: trattamento delle infezioni miste da cestodi adulti (tenie) e nematodi (ascaridi) delle seguenti specie:
Cestodi: *Dipylidium caninum, Taenia* spp., *Echinococcus* spp., *Mesocestoides* spp.
Nematodi: *Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis* (Riduzione del livello di infezione), *Angiostrongylus vasorum* (riduzione del livello di infezione da parte di adulti immaturi (L5) e dei parassiti adulti; vedi specifici programmi di prevenzione e trattamento delle malattie nella sezione. **"AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE "**).
Il prodotto può essere utilizzato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*), se è indicato il trattamento concomitante contro cestodi.

■ **CONTROINDICAZIONI**

Milpro Vet 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli	Milpro Vet 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani
Non utilizzare nei cuccioli di età inferiore alle 2 settimane di età e / o peso inferiore a 0,5 kg.	Non utilizzare nei cani di peso inferiore a 5 kg.

Vedere anche il punto " Speciali precauzioni per l'impiego". Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti. Vedere anche il punto **"AVVERTENZE SPECIALI".**

■ **REAZIONI AVVERSE:** In occasioni molto rare, dopo la somministrazione del medicinale veterinario possono essere osservati nei cani sintomi sistemici (come ad esempio letargia), sintomi neurologici, (quali tremori muscolari e atassia) e / o sintomi gastrointestinali (quali vomito, diarrea, anoressia e scialorrea).
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

■ **SPECIE DI DESTINAZIONE:** Cani.

■ **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:**
Per uso orale. La dose minima raccomandata è di: 0,5 mg di milbemicina ossima e di 5 mg di praziquantel per kg di p.v. per singola somministrazione orale. Il prodotto deve essere somministrato con o dopo un po' di cibo.
Le compresse sono appetibili e facili da somministrare (di solito cani adulti e cuccioli le accettano volontariamente anche senza cibo). Le compresse possono essere divise a metà.
A seconda del peso corporeo del cane, il dosaggio raccomandato è il seguente:

Peso	Milpro Vet 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli	Milpro Vet 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani
0,5 – 1 kg	½ compressa	
1 – 5 kg	1 compressa	
5 – 10 kg	2 compresse	
5 – 25 kg		1 compressa
25 – 50 kg		2 compresse
50 – 75 kg		3 compresse

Nei casi in cui viene usato per la prevenzione di dirofilaria e allo stesso tempo è necessario un trattamento contro la tenia, il prodotto può sostituire il prodotto monovalente per la prevenzione della filaria.

■ **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE:** Per le infezioni da *Angiostrongylus vasorum*, milbemicina ossima deve essere somministrata quattro volte a intervalli di una settimana. Si raccomanda, quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi, il trattamento con il prodotto una sola volta e continuare con il prodotto monovalente contenente solo milbemicina ossima, per i rimanenti tre trattamenti settimanali. Nelle aree endemiche, dove è indicato un trattamento concomitante contro cestodi, la somministrazione del prodotto ogni quattro settimane impedirà l'angiostrongilosi riducendo gli adulti immaturi (L5) e la carica dei parassiti adulti.

■ **TEMPO DI ATTESA:** Non pertinente.

■ **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:** Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Milpro Vet 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli	Milpro Vet 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani
Tenere il blister nell'imballaggio esterno. Le compresse divise devono essere conservate nel blister originale e possono essere usate per la successiva somministrazione. Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi	Tenere il blister nell'imballaggio esterno

Non utilizzare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

■ **AVVERTENZE SPECIALI:**
Avvertenze speciali per l'impiego negli animali: Al fine di sviluppare un programma di controllo antiparassitario efficace devono essere prese in considerazione informazioni epidemiologiche locali e le condizioni di vita del cane e, pertanto, si raccomanda di consultare un medico veterinario. La resistenza dei parassiti a qualsiasi particolare classe di antielmintici può svilupparsi in seguito ad uso frequente e ripetuto di un antielmintico di quella classe.
Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Studi con milbemicina ossima indicano che il margine di sicurezza in alcuni cani di razza Collie o razze correlate è minore che in altre razze. In questi cani, la dose raccomandata deve essere rigorosamente rispettata. La tollerabilità del prodotto in giovani cuccioli di queste razze non è stata studiata. La sintomatologia clinica nei Collies è simile a quella osservata nella popolazione canina in generale, quando sovra dosata (vedere paragrafo Sovradosaggio). Come da buone pratiche veterinarie, gli animali devono essere pesati per garantire un dosaggio accurato. Il trattamento di cani con un elevato numero di microfilarie circolanti può portare talvolta alla comparsa di reazioni di ipersensibilità, quali pallore delle mucose, vomito, tremori, respiro affannoso o eccessiva salivazione. Queste reazioni sono associate con il rilascio di proteine dalle microfilarie morte o morenti e non sono un effetto tossico diretto del prodotto. L'uso in cani con microfilaremia non è quindi raccomandato. Nelle zone a rischio filaria, o nel caso si sappia che un cane ha viaggiato da e per le aree a rischio di filariosi cardiopolmonare, prima di utilizzare il prodotto, è consigliata una visita dal veterinario per escludere la presenza di qualsiasi infestazione concomitante di *Dirofilaria immitis*. Nel caso di una diagnosi positiva, è indicata una terapia adulticida prima di somministrare il prodotto. L'Echinococcosi rappresenta un pericolo per l'uomo. In caso di echinococcosi, devono essere seguite le linee guida specifiche per il trattamento e il follow-up per la salvaguardia delle persone. Devono essere consultati gli esperti o gli istituti di parassitologia.
Se il cane ha soggiornato in aree dove *Echinococcus multilocularis* è endemico deve essere consultato un veterinario.
Non sono stati condotti studi con cani gravemente debilitati o in soggetti con grave compromissione epatica o renale. Il prodotto non è raccomandato per questi animali o solo in seguito ad una valutazione del rischio / beneficio da parte del veterinario responsabile. Nei cani con meno di 4 settimane di vita, l'infezione da tenie è rara. Il trattamento degli animali di età inferiore alle 4 settimane con un prodotto combinato può pertanto non essere necessaria.
Sicurezza per l'utilizzatore – Leggere prima di ogni utilizzo: Lavarsi le mani dopo la somministrazione. In caso di ingestione accidentale delle compresse, in particolare da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico e mostrargli il foglietto illustrativo o l'etichetta.
Gravidanza e allattamento: In uno studio, è stato dimostrato che questa associazione di principi attivi è ben tollerata in cagne da riproduzione, anche durante la gravidanza e l'allattamento. Poiché non è stato effettuato uno studio specifico con questo prodotto, usare durante la gravidanza e l'allattamento solo in base a una valutazione del rischio / beneficio del veterinario responsabile.
Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: L'uso concomitante della combinazione praziquantel / milbemicina ossima con selamectina è ben tollerato. Non sono state osservate interazioni quando la dose raccomandata del lattone macrociclico selamectina è stata somministrata durante il trattamento con la combinazione alla dose raccomandata. In assenza di ulteriori studi, si deve usare cautela in caso di uso concomitante del prodotto e altri lattoni macrociclici. Non sono stati condotti studi su animali riproduttori.
Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Non sono stati osservati altri sintomi oltre a quelli osservati con la dose raccomandata (vedere paragrafo REAZIONI AVVERSE).

■ **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI:** Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Il prodotto non deve essere disperso in corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci e altri organismi acquatici.

■ **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:** settembre 2014

■ **ALTRE INFORMAZIONI:** Confezioni:

Milpro Vet 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli	Milpro Vet 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani
Scatola di cartone da 2 compresse contenente 1 blister da 2 compresse divisibili	Scatola di cartone da 2 compresse contenente 1 blister da 2 compresse divisibili
Scatola di cartone da 4 compresse contenente 2 blister da 2 compresse divisibili	Scatola di cartone da 4 compresse contenente 2 blister da 2 compresse divisibili
Scatola di cartone da 24 compresse contenente 12 blister da 2 compresse divisibili	Scatola di cartone da 24 compresse contenente 12 blister da 2 compresse divisibili
	Scatola di cartone da 48 compresse contenente 24 blister da 2 compresse

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

XXXXXXXX

Validation par anticipation suite accord du RP Virbac ; Mail de SB 17/04/2015

APPROUVÉ
Par VINHAS Joaquim , 09:59, 05/05/2015

Anna RONDOLOTTI

Firmato digitalmente da Anna RONDOLOTTI
ND: cn=Anna RONDOLOTTI, o=VB SRL, ou=Regulatory, email=anna.rondolotti@virbac.it, c=IT
Data: 2015.03.23 15:46:32 +01'00'