

(ETICHETTA ESTERNA)

MYOTROFIL

Soluzione iniettabile 20 ml

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principi attivi:

Magnesio aspartato tetraidrato	1.75 g
Potassio aspartato emidrato	1.30 g
Adenosina monofosfato bisodico	0.25 g
Carnitina cloridrato	0.20 g
Eptaminolo cloridrato	0.50 g
Sodio selenito	0.05 g

Eccipienti:

paraidrossibenzoato di metile
paraidrossibenzoato di propile q.b. a 100 ml

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile.

CONFEZIONE

Flacone da 20 ml.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, ovini, suini, cani, gatti.

INDICAZIONI, MODALITA', VIA DI SOMMINISTRAZIONE E AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

POSOLOGIA PRESCRITTA:

TEMPI DI ATTESA

Carni e latte zero giorni.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e proteggere dalla luce.

SPECIALI PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile

**SOLO PER USO VETERINARIO
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Lotto N° Scadenza

Dopo apertura, usare entro 28 giorni

AIC n. 100080011

Prezzo €

IZO srl a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

(ETICHETTA INTERNA)

MYOTROFIL

Soluzione iniettabile 20 ml

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono:

Principi attivi:

Magnesio aspartato tetraidrato	1.75 g
Potassio aspartato emidrato	1.30 g
Adenosina monofosfato bisodico	0.25 g
Carnitina cloridrato	0.20 g
Eptaminolo cloridrato	0.50 g
Sodio selenito	0.05 g

Eccipienti:

paraidrossibenzoato di metile	
paraidrossibenzoato di propile q.b. a	100 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, ovini, suini, cani, gatti.

INDICAZIONI, MODALITA', VIA DI SOMMINISTRAZIONE E AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

TEMPI DI ATTESA

Carni e latte zero giorni.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Leggere il foglietto illustrativo.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile

SOLO PER USO VETERINARIO

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Lotto N° Scadenza

Dopo apertura, usare entro 28 giorni

AIC n. 100080011

IZO srl a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Bresc

(ETICHETTA ESTERNA)

MYOTROFIL

Soluzione iniettabile 100 ml

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di soluzione contengono:

Principi attivi:

Magnesio aspartato tetraidrato	1.75 g
Potassio aspartato emidrato	1.30 g
Adenosina monofosfato bisodico	0.25 g
Carnitina cloridrato	0.20 g
Eptaminolo cloridrato	0.50 g
Sodio selenito	0.05 g

Eccipienti:

sorbitolo	
paraidrossibenzoato di metile	
paraidrossibenzoato di propile	
acqua p.p.i	q.b. a 100 ml

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile.

CONFEZIONE

Flacone da 100 ml.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, ovini, suini, cani, gatti.

INDICAZIONI, MODALITA', VIA DI SOMMINISTRAZIONE E AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

POSOLOGIA PRESCRITTA:

TEMPI DI ATTESA

Carni e latte zero giorni.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e proteggere dalla luce.

SPECIALI PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile

**SOLO PER USO VETERINARIO
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Lotto N° Scadenza

Dopo apertura, usare entro 28 giorni

AIC n. 100080023

IZO srl a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

(ETICHETTA INTERNA)

MYOTROFIL
Soluzione iniettabile 100 ml

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono:

Principi attivi:

Magnesio aspartato tetraidrato	1.75 g
Potassio aspartato emidrato	1.30 g
Adenosina monofosfato bisodico	0.25 g
Carnitina cloridrato	0.20 g
Eptaminolo cloridrato	0.50 g
Sodio selenito	0.05 g

Eccipienti:

sorbitolo	
paraidrossibenzoato di metile	
paraidrossibenzoato di propile	
acqua p.p.i.	q.b. a 100 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, ovini, suini, cani, gatti.

INDICAZIONI, MODALITA', VIA DI SOMMINISTRAZIONE E AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

TEMPI DI ATTESA

Carni e latte zero giorni.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Leggere il foglietto illustrativo.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile

**SOLO PER USO VETERINARIO
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Lotto N° Scadenza

**Dopo apertura, usare entro 28 giorni
AIC n. 100080023
IZO srl a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia**

(FOGLIO ILLUSTRATIVO)

Titolare AIC:

IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia.

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio lotto
IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2 27013 Chignolo Po (Pavia)**

MYOTROFIL

Soluzione iniettabile.

Flacone da 20 ml e da 100 ml.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Principi attivi:

Magnesio aspartato tetraidrato	1.75 g	
Potassio aspartato emidrato		1.30 g
Adenosina monofosfato bisodico		0.25 g
Carnicina cloridrato		0.20 g
Eptaminolo cloridrato		0.50 g
Sodio selenito		0.05 g

Eccipienti:

sorbitolo		
paraidrossibenzoato di metile		
paraidrossibenzoato di propile		
acqua p.p.i.	q.b. a	100 ml

INDICAZIONI

Coadiuvante per miopatie dismetaboliche.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, ovini, suini, cani, gatti.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per via intramuscolare, sottocutanea, endovenosa lenta.

Bovini – equini:	20 ml /capo
Puledri – vitelli:	20 ml /capo
Agnelli:	2 ml /capo
Suini:	10-15 ml /capo
Suinetti:	2 ml per 10 kg di peso
Cani, gatti:	1-2 ml/capo per via intramuscolare o sottocutanea.

A scopo preventivo, una iniezione alla settimana per 2-3 settimane.

Trattamento: una iniezione ogni 3 giorni per 4 volte.

Per la prevenzione della miopatia essudativa del suino due iniezioni a 8 ore di intervallo.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

TEMPI DI ATTESA

Carne e latte zero giorni.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo asciutto e proteggere dalla luce.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità del medicinale veterinario dopo la prima apertura: 28 giorni.

AVVERTENZE SPECIALI

Uso e dosi possono variare solo sotto parere del medico veterinario.

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche.

Può essere utilizzato nel corso della gravidanza e dell'allattamento.

In assenza degli studi di incompatibilità, non miscelare con altri medicinali veterinari.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

12/2013

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate