

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

**Nobivac<sup>®</sup> Tricat Trio, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile, per gatti**

### **1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
NL – 5831 AN Boxmeer

#### **Rappresentante in Italia:**

MSD Animal Health S.r.l.  
Via Fratelli Cervi snc  
Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova  
20090 Segrate (MI)

### **2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Nobivac<sup>®</sup> Tricat Trio, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile, per gatti

### **3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Per dose da 1 ml:

#### Liofilizzato

#### **Principi attivi:**

Calicivirus felino vivo attenuato, ceppo F9:  $\geq 4.6 \log_{10}$  PFU<sup>1</sup>

Herpesvirus felino tipo 1 vivo attenuato, ceppo G2620A:  $\geq 5.2 \log_{10}$  PFU<sup>1</sup>

Virus della panleucopenia felina vivo attenuato, ceppo MW-1:  $\geq 4.3 \log_{10}$  CCID<sub>50</sub><sup>2</sup>

<sup>1</sup>PFU: Unità Formanti-Placca

<sup>2</sup>CCID<sub>50</sub>: Dose Infettante il 50% delle colture cellulari

Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

Liofilizzato biancastro.

### **4. INDICAZIONI**

Immunizzazione attiva dei gatti a partire da 8-9 settimane di vita in poi per ridurre i sintomi clinici causati dall'infezione con Calicivirus felino (FCV) ed Herpesvirus felino tipo 1 (FHV, virus della rinotracheite felina), e per prevenire i sintomi clinici, l'escrezione virale e la leucopenia causati dal virus della panleucopenia felina (FPLV).

L'insorgenza dell'immunità è di 4 settimane per le componenti FCV e FHV, e di 3 settimane per la componente FPLV.

L'immunità ha una durata di 1 anno per le componenti FCV e FHV e di 3 anni per la componente FPLV.

### **5. CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento, poiché il prodotto non è stato testato in animali gravidi o in allattamento. Il virus vivo FPL può provocare problemi riproduttivi nelle gatte gravide e difetti congeniti nella progenie.

## 6. REAZIONI AVVERSE

Al sito d'inoculo si può osservare una leggera tumefazione dolente che permane per 1-2 giorni. Si può inoltre verificare un leggero e transitorio aumento della temperatura corporea (fino a 40°C) della durata di 1-2 giorni. In alcuni casi, nei due giorni seguenti la vaccinazione si possono osservare starnuti, tosse, scolo nasale ed un leggero torpore o riduzione dell'appetito.

In casi molto rari il vaccino può causare reazioni di ipersensibilità (prurito, dispnea, vomito, diarrea e collasso).

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti.

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Almeno 4.6 log<sub>10</sub> PFU di FCV, ceppo F9, 5.2 log<sub>10</sub> PFU di FVR, ceppo G2620A e 4.3 log<sub>10</sub> CCID<sub>50</sub> di FPLV, ceppo MW-1 in 1.0 ml di solvente.

Come vaccinazione di base, è necessario somministrare per via sottocutanea due dosi ad intervallo di 3-4 settimane. La prima vaccinazione deve essere somministrata a partire da 8-9 settimane di età, la seconda dall'età di 12 settimane

### Richiamo:

Una singola dose (1 ml) secondo il seguente schema:

Rivaccinare ogni anno nei confronti del calicivirus felino e dell'herpesvirus felino di tipo 1 (con vaccini che contengano i ceppi F9 o G2620, ove disponibili).

Rivaccinare ogni tre anni nei confronti del virus della panleucopenia felina (con il ceppo MW-1 come in Nobivac<sup>®</sup> Tricat Trio, se disponibile)

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Ricostituire la frazione liofilizzata del vaccino subito prima dell'uso con il relativo "Solvente per la ricostituzione del vaccino liofilizzato per gatti Nobivac<sup>®</sup> Tricat Trio" fornito con il vaccino.

Nel caso delle confezioni da 10 o 50 flaconi da 1 dose, dove non viene fornito il diluente, utilizzare un flacone della specialità medicinale Intervet "Solvente per vaccini p.a.", venduto separatamente.

Introdurre il solvente nella fiala di vaccino liofilizzato e agitare leggermente fino a completa dissoluzione della pastiglia. Quando il vaccino ha raggiunto la temperatura ambiente somministrare 1 ml di vaccino per via sottocutanea. Usare una siringa sterile ma evitare il contatto del vaccino con i disinfettanti.

Il vaccino ricostituito deve essere utilizzato entro 30 minuti.

## 10. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Liofilizzato: conservare in frigorifero (2-8°C).

Proteggere dalla luce.

Solvente: può essere conservato a temperatura inferiore a 25°C separatamente dal liofilizzato.

Non congelare.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta

## 11. AVVERTENZE SPECIALI

### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Vaccinare solo animali sani.

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Gli anticorpi di origine materna, che possono persistere fino all'età di 9-12 settimane, possono avere un effetto negativo sull'efficacia della vaccinazione. In presenza di anticorpi di origine materna dopo la vaccinazione si può avere una prevenzione non completa dei sintomi clinici, della leucopenia e dell'escrezione virale a seguito di un'infezione con FPLV. In tali casi, quando è probabile la presenza di un livello relativamente alto di anticorpi materni, adeguare lo schema vaccinale di conseguenza.

**Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione**

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali**

In caso di autoinoculazione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza, antidoti)** Con un sovradosaggio pari a 10 dosi, si può presentare una piccola tumefazione dolente al sito d'inoculo che permane per 4-10 giorni.

Si può verificare un leggero e transitorio aumento della temperatura (fino a 40,8°C) della durata di 1-2 giorni

In alcuni casi e per pochi giorni dopo la vaccinazione si può osservare malessere generale, tosse, starnuti, letargia transitoria e riduzione dell'appetito.

**Incompatibilità**

Non miscelare con altri medicinali veterinari.

**12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE VETERINARIO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Eliminare i rifiuti mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo approvato per l'uso dalle autorità competenti. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati ed i rifiuti derivanti da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non autorizzati o scaduti.

**13. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Febbraio 2015

**14. ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

5 o 25 flaconi di vaccino da 1 dose con solvente

10 o 50 flaconi di vaccino da 1 dose

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.