

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio responsabile per il rilascio dei lotti:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN Boxmeer

Rappresentante in Italia:

Intervet Italia S.r.l.
Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Nobivac[®] Rabbia, sospensione iniettabile

3. INDICAZIONE DELLA SOSTANZA(E) ATTIVA(E) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni dose (1 ml) contiene:

Principio attivo:

Virus della Rabbia, ceppo Pasteur RIV, in quantità in grado di indurre almeno 2 U.I. al test di efficacia. Il virus viene coltivato sulla linea cellulare BHK-21 clone CT, inattivato con β -propiolattone ed adsorbito in fosfato di alluminio.

Adiuvante:

AlPO₄ 2%

Conservante:

Tiomersale 0,1 mg (0,01%)

4. INDICAZIONI

Immunizzazione attiva di cani, gatti, volpi e furetti contro il virus della rabbia.

5. CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

6. REAZIONI AVVERSE

Dopo somministrazione sottocutanea occasionalmente può verificarsi nel punto d'inoculo un nodulo palpabile transitorio, che può anche essere dolente.

Come per tutti i vaccini, in alcuni animali può essere osservata una occasionale reazione di ipersensibilità. In caso di reazione anafilattica instaurare un'adeguata terapia sintomatica.

Se dovessero manifestarsi effetti gravi non menzionati in questo foglio, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti, volpi e furetti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La dose è di 1 ml, da somministrarsi per via sottocutanea o intramuscolare a seconda della specie animale.

Programma vaccinale raccomandato

	Cani/gatti	Volpi/furetti
Vaccinazione primaria ad un'età superiore a	3 mesi*	3 mesi*
Richiamo vaccinale ogni	3 anni**	1 anno**
Via di somministrazione	i.m./s.c.	s.c.

* La vaccinazione primaria può essere effettuata in età più precoce, ma allora si dovrà effettuare un richiamo vaccinale all'età di 3 o 6 mesi a seconda della specie.

** L'intervallo consigliato per i richiami vaccinali si basa su risultati ottenuti con prove di infezione sperimentale. Disposizioni locali vigenti possono richiedere rivaccinazioni più ravvicinate.

I risultati ottenuti da indagini sierologiche indicano che la vaccinazione delle volpi e dei furetti fornisce una protezione di almeno un anno.

Immunità e reazioni vaccinali

La vaccinazione induce un picco elevato di livelli anticorpali nel giro di 3 settimane, seguito da un livello più o meno costante sufficientemente elevato per proteggere gli animali.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso lasciare che il vaccino raggiunga la temperatura ambiente (15°-25°C).

Usare un'attrezzatura per iniezione sterile.

Agitare prima e durante l'uso.

10. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero a +2°/+8°C. Non congelare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

11. AVVERTENZE SPECIALI

Vaccinare solo animali sani.

Dopo la somministrazione, possono occasionalmente verificarsi reazioni generalizzate di ipersensibilità.

In questi casi può essere indicata la somministrazione sottocutanea di adrenalina.

A causa della presenza del conservante tiomersale, vaccinare gli animali da reddito (bovini, pecore, capre e cavalli) utilizzando esclusivamente le presentazioni multidose

Nobivac Rabbia può essere impiegato per la ricostituzione dei vaccini liofilizzati per cani: Nobivac CE, Nobivac Parvo-c, Nobivac CEP, Nobivac CEPPi, Nobivac Ppi, e del vaccino liofilizzato per gatti: Nobivac Tricat e può essere somministrato in associazione al vaccino Nobivac Lepto contro la Leptospirosi canina.

Non miscelare con altri medicinali veterinari ad eccezione di quelli sopra menzionati.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari, tranne i prodotti summenzionati. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

Il vaccino può essere usato in gravidanza.

L'autoinoculazione accidentale di questo vaccino può provocare reazioni locali. In caso di autoinoculazione accidentale pulire e disinfettare il punto di inoculo e rivolgersi al medico mostrandogli il foglietto illustrativo del prodotto.

Non sono disponibili dati sul sovradosaggio.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI SCARTO

Il prodotto inutilizzato deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

13. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Luglio 2009

14. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

Flaconi da 1 dose. Scatole da 10, 50 o 100 flaconi.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate