



OVAX[®]-M.G.S.

vaccino inattivato in sospensione iniettabile per ovini

Titolare A.I.C.: **FATRO S.p.A.** - Ozzano Emilia (BO)

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: **FATRO S.p.A.** - Ozzano Emilia (BO)

■ INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una dose di vaccino (2 ml) contiene:

Principi attivi:

culture *S.aureus* inattivate: 16x10⁹ UFC; α -antossina stafilococcica: 120 Unità emolitiche; β -antossina stafilococcica: 2000 Unità emolitiche.

Per indurre una risposta sierologica nella cavia $\geq 0,5$ U./ml (α -tossina) e ≥ 80 U.I.E. * (β -tossina)

*U.I.E.: unità di inibizione emolisi.

Adiuvante: Alluminio idrossido 30 mg.

Conservante: Sodio etilmercurio tiosalicilato 0,2 mg.

■ INDICAZIONI

Per l'immunizzazione attiva delle pecore per prevenire la mortalità, i sintomi e le lesioni della mastite gangrenosa da *S.aureus*.

L'immunità si instaura a partire da 7-10 giorni dopo la prima vaccinazione e perdura per 3-4 mesi dopo il richiamo.

■ CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

■ REAZIONI AVVERSE

Il vaccino può provocare, limitatamente al giorno seguente la vaccinazione, la comparsa di una leggera ipertermia transitoria.

In caso di manifestazione di ipersensibilità allergica, intervenire subito con antistaminici.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

■ SPECIE DI DESTINAZIONE - Ovini.

■ POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il vaccino va inoculato per via sottocutanea alla dose di 2 ml per capo.

Programma vaccinale

1° intervento: vaccinare tutti i soggetti circa 30-45 giorni prima dell'inizio dei parti

2° intervento: 2-3 settimane dopo il primo.

Negli allevamenti colpiti negli anni precedenti da mastite gangrenosa in forma grave e con alta percentuale di soggetti colpiti, si consiglia un 3° intervento vaccinale circa 3 mesi dopo il secondo.

In caso fosse necessario vaccinare il gregge quando si sono manifestati già alcuni casi di malattia (vaccinazione d'urgenza), intervenire su tutti gli animali sani contemporaneamente, con richiamo dopo 10-15 giorni.

■ AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

I flaconi contenenti il vaccino devono essere agitati prima e durante l'uso.

■ TEMPO DI ATTESA - Zero giorni.

■ PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C. Non congelare.

Dopo prima apertura il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

■ AVVERTENZE SPECIALI

Somministrare a soggetti in buone condizioni di salute.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

In caso di manifestazioni di ipersensibilità allergica, intervenire subito con anti-istaminici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

L'autoinoculazione accidentale di questo vaccino può provocare reazioni locali.

In caso di autoinoculazione accidentale pulire e disinfettare il sito di inoculo e rivolgersi al medico mostrandogli il foglietto illustrativo del prodotto.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento e l'ovodeposizione

Può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento

La somministrazione del vaccino in lattazione può provocare una transitoria flessione della produzione latte, con rientro nella norma entro 3-4 giorni.

Interazione con altri farmaci ed altre forme di interazione

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso.

Sovradosaggio

La somministrazione di una dose doppia può provocare lieve e transitoria (circa 2 ore) dispnea.

Incompatibilità

Non mescolare questo prodotto con altri medicinali veterinari

■ PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il materiale residuo deve essere conferito negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA NON RIPETIBILE

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO - Ottobre 2009.

SOLO PER USO VETERINARIO

Confezioni

Flacone da 100 ml (50 dosi)

Flacone da 250 ml (125 dosi)

