

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Phosphorum B12
100,00 mg/ml + 0,05 mg/ml
soluzione iniettabile per bovini, cani, gatti e animali da pelliccia
Butafosfan e Cianocobalamina

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI:

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Elanco Italia S.p.A.
Via dei Colatori, 12
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Fabbricante Responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinaer Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel
(Germania)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Phosphorum B12, 100,00 mg/ml + 0,05 mg/ml
soluzione iniettabile per bovini, cani, gatti e animali da pelliccia
Butafosfan e Cianocobalamina

3. INDICAZIONE(I) DEI(L) PRINCIPI(O) ATTIVI(O) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml di soluzione contiene:

- principi attivi:
Butafosfan 100,00 mg
Cianocobalamina 0,05 mg
- eccipienti:
Alcool n-butilico

4. INDICAZIONE(I)

Soluzione iniettabile al 10% di butafosfan con aggiunta di Vitamina B 12 per la terapia fosforica e stimolante.

Coadiuvante nel trattamento di:

- A) Malattie acute e disturbi acuti del ricambio, ad esempio
debolezza organica e malattie dei neonati, stati di astenia dei piccoli animali domestici (cani, gatti) e a completamento della terapia calcica.
- B) Malattie croniche e disturbi cronici del ricambio, ad esempio
ritardi nello sviluppo dei giovani animali conseguenti a malattie di allevamento;
disturbi generali del ricambio negli animali domestici in seguito ad alimentazione inadatta od unilaterale e manifestazioni conseguenti.

Disturbi stagionali del ricambio nei bovini con le conseguenti manifestazioni: paraplegie ipofosfatemiche, inappetenza, indigestione cronica o sovraccarico degli stomaci, dimagrimento, diminuzione della produzione latte, manifestazioni nervose, sterilità.

Anemia secondaria, anemia da verminosi; stress; affaticamento; esaurimento; dimagrimento; convalescenze.

C) Altre indicazioni (in animali sani)

per migliorare il rendimento dei cani sottoposti a stress e a particolari attività;

per aumentare le difese organiche;

per stimolare la crescita specialmente nei cuccioli e negli animali da pelliccia.

5. CONTROINDICAZIONI

Non indicato nei cani e gatti affetti da insufficienza renale cronica.

Non usare in animali con ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

In cani e gatti sono stati segnalati rari casi di dolore al sito d'inoculo dopo somministrazione per via sottocutanea.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, cani, gatti e animali da pelliccia.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il Phosphorum B 12 può essere somministrato nel bovino solo per via endovenosa; nelle restanti specie può essere somministrato endovena, intramuscolo o sottocute.

La posologia e la durata di somministrazione devono essere stabiliti nell'ambito dei range sottoindicati caso per caso, in rapporto alla forma morbosa da trattare e sua gravità, alla risposta al trattamento, ecc.

Si consigliano i seguenti dosaggi giornalieri per capo:

a) nelle malattie acute a seconda dei casi, della taglia e dell'età:

- bovino 5,0-25,0 ml
- vitello 5,0-12,0 ml
- cane 0,5-5,0 ml
- gatto, animali da pelliccia 0,5-2,5 ml

Le suddette dosi si possono ripetere giornalmente, fino a quando è necessario, a giudizio del medico veterinario.

b) nelle malattie croniche:

dosi dimezzate rispetto a quelle di cui alla lettera a); ripetere in caso di necessità ad intervalli di 1-2 settimane od a periodi più brevi.

c) altre indicazioni: dosi come in b).

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Carne, visceri e latte

Bovini: Zero giorni

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non congelare.

Proteggere dalla luce.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Il Phosphorum B12 nei bovini non deve essere somministrato per via intramuscolare o sottocutanea.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Prima della somministrazione assicurarsi della pulizia e disinfezione del sito di inoculo.

Impiegare il medicinale sotto controllo del medico veterinario, per evitare la somministrazione di dosi eccessive.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Fare attenzione durante la somministrazione del prodotto per evitare autoiniezioni accidentali.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo devono somministrare il prodotto con cautela.

Sovradosaggio

Evidenze cliniche hanno dimostrato la tollerabilità nelle specie di destinazione fino a dosaggi pari a 5 volte la dose raccomandata.

Incompatibilità

Non miscelare con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

Marzo 2021

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

1 flacone da 100 ml.