

INTRAMAMMARIA

Rilexine 200 T Lattazione

(CEFALESSINA MONOIDRATA)

USO VETERINARIO

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una siringa da 10 ml contiene :

Principio attivo

Cefalessina monoidrata 210 mg
(corrispondente a cefalessina 200 mg)

Eccipienti

Butilidrossianisolo
Alcool benzilico

INDICAZIONI

RILEXINE 200 T è indicato nel trattamento delle infezioni intramammarie causate da germi Gram positivi e Gram negativi, quali : *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus gruppo G (β-haemolyticus)*.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali con ipersensibilità nota alle cefalosporine o altre sostanze del gruppo dei beta-lattamici.

REAZIONI AVVERSE

In caso di reazione da ipersensibilità instaurare un idoneo trattamento sintomatico.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE


Bovine in lattazione.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il contenuto di una siringa deve essere applicato in ogni quarto interessato dopo la mungitura a intervalli regolari di 12 ore per 4 mungiture consecutive.


Modalità d'impiego

Prima dell'applicazione, il quarto ed il capezzolo devono essere puliti e disinfettati accuratamente evitando la contaminazione del capo dell'iniettore.



1- Cannula corta

Introduzione del prodotto nella prima parte del canale del capezzolo



2- Cannula lunga

Introduzione del prodotto in profondità del capezzolo

L'opzione n° 1 permette, qualora si ritenga necessario, di ridurre i rischi di traumatismi e contaminazione del capezzolo.

La cannula è sterile fino al momento dell'apertura.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Dopo l'applicazione si raccomanda di utilizzare uno spray disinfettante o una spugnetta imbevuta di un prodotto disinfettante.

TEMPO DI ATTESA

Latte : 48 ore pari a 4 mungiture.

Carne : 6 giorni.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione d'origine a temperatura inferiore a 25°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

L'uso inappropriato del prodotto può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla cefalessina e può ridurre l'efficacia del trattamento con altri antibiotici betalattamici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza. A causa di possibili variazioni (nel tempo o geografiche) della sensibilità delle specie microbiche target alla cefalessina si raccomanda di effettuare l'esame batteriologico e test di sensibilità.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Rispettare le usuali precauzioni di asepsi durante la somministrazione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con ipersensibilità nota alla cefalessina dovrebbero evitare il contatto con il prodotto.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Il prodotto va utilizzato nel periodo della lattazione.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

L'effetto battericida degli antibiotici betalattamici è neutralizzato dall'uso simultaneo di farmaci batteriostatici (macrolidi, sulfonamidi e tetracicline).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Incompatibilità

Non note

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Luglio 2013.

ALTRE INFORMAZIONI

Confezione da 4 siringhe da 10 ml
Confezione da 12 siringhe da 10 ml
Confezione da 60 siringhe da 10 ml

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - FRANCIA
Rappresentante per la vendita in Italia : VIRBAC S.r.l - via Caldera, 21 - 20153 Milano.

81462608