

Selgian® 8 kg

Selgian® 20 kg



Selegilina (sotto forma di cloridrato)

Compresse frazionabili per somministrazione orale nel cane.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA

Ogni compressa da 204 mg di SELGIAN 8 KG contiene:

principi attivi: Selegilina (sotto forma di cloridrato) 3,35 mg.
Eccipienti q.b.a. 204,00 mg.

Ogni compressa da 510 mg di SELGIAN 20 KG contiene:

principi attivi: Selegilina (sotto forma di cloridrato) 8,37 mg.
Eccipienti q.b.a. 510,00 mg.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- Trattamento delle turbe comportamentali di origine puramente emozionale: depressione, distimia, ansia.
- In associazione con una terapia comportamentale, trattamento delle turbe di origine emozionale, riscontrate in concomitanza con l'ipersensibilità/iperattività, ansia da separazione, sindrome da privazione e fobie generalizzate.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani (da 1,5 a 17 kg e da 8 a 42 kg).

CONTROINDICAZIONI

Date le sue proprietà di IMAO, la selegilina può agire sulla secrezione della prolattina. In assenza di studi specifici si raccomanda di non somministrare il prodotto alle cagne gestanti e durante l'allattamento.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Le turbe emozionali possono mascherare conflitti gerarchici: nel caso di un cane dominante che soffre di turbe emozionali, l'alleviamento di tali turbe può eventualmente rivelare l'aggressività latente del cane. In questi casi va instaurata una terapia comportamentale.

In caso di ingestione accidentale contattare il medico e mostrargli il foglio illustrativo o l'etichetta.

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale. Somministrare la mattina a digiuno ponendo la compressa nella gola dell'animale.

0,42 mg di selegilina/kg/giorno, pari a 0,5 mg di cloridrato di selegilina/kg/giorno in una somministrazione unica al mattino a digiuno secondo la seguente tabella:

Selgian 8 kg:

numero di compresse da somministrare secondo il peso:

Peso del cane in kg	Numero di compresse di Selgian 8 kg
da 1,5 a 3	1/4
da 3 a 5	1/2
da 5 a 7	3/4
da 7 a 9	1
da 9 a 11	1 1/4
da 11 a 13	1 1/2
da 13 a 15	1 3/4
da 15 a 17	2

Selgian 20 kg:

numero di compresse da somministrare secondo il peso:

Peso del cane in kg	Numero di compresse di Selgian 20 kg
da 8 a 12	1/2
da 12 a 17	3/4
da 17 a 22	1
da 22 a 27	1 1/4
da 27 a 32	1 1/2
da 32 a 37	1 3/4
da 37 a 42	2

La durata minima del trattamento è di 2 mesi.

Il trattamento deve essere mantenuto fino ad una stabilizzazione dello stato clinico e deve essere interrotto senza diminuzione progressiva.

DOSE ECCESSIVA (SINTOMATOLOGIA, PROCEDURE D'URGENZA, ANTIDOTI)

La somministrazione di selegilina per un anno al doppio della dose terapeutica raccomandata non ha provocato nel cane effetti secondari. La somministrazione del prodotto ad una dose corrispondente a 5 volte quella terapeutica nell'arco di tre mesi è ben tollerata, con possibili segni sporadici di vomito e ptialismo in alcuni cani. Tali segni si possono considerare come primi sintomi di surdosaggio.

EFFETTI INDESIDERATI

In casi molto rari (meno di 1 animale su 100.000) effetti indesiderati come tremolio o vomito possono verificarsi negli animali trattati.

AVVERTENZE

L'utilizzazione di una posologia inferiore a quella raccomandata può esacerbare l'aggressività del cane nel caso di conflitto gerarchico latente.

Se non si osserva alcun miglioramento entro due mesi, è inutile continuare nel trattamento.

IMPIEGO NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA E DELL'ALLATTAMENTO

Vedere le controindicazioni.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 25°C

EVENTUALI PRECAUZIONI SPECIALI DA PRENDERE (LADDOVE OPPORTUNO) PER ELIMINARE IL MEDICINALE VETERINARIO INUTILIZZATO O MATERIALI DI RIFIUTO PRODOTTI DALL'UTILIZZAZIONE DEL MEDICINALE

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

CONFEZIONI

Selgian 8 kg

- * Scatola con 3 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 10 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 50 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 1 flacone in vetro da 30 compresse divisibili
- * Scatola con 1 flacone in vetro da 100 compresse divisibili

Selgian 20 kg

- * Scatola con 3 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 10 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 50 blister (PVC-alluminio) termosaldati da 10 compresse divisibili
- * Scatola con 1 flacone in vetro da 30 compresse divisibili
- * Scatola con 1 flacone in vetro da 100 compresse divisibili

ULTERIORI INFORMAZIONI

La selegilina, analogo strutturale della feniletilamina è un inibitore della monoamino ossidasi (MAO). Come IMAO-A e IMAO-B modifica le concentrazioni dei neurotrasmettitori monoaminergici (dopamina, serotonina, norepinefrina e epinefrina) ed è neoroprotettore nei confronti dei radicali liberi e neurotossici. Dopo somministrazione orale, il cloridrato di selegilina viene rapidamente assorbito. La biodisponibilità orale nel cane varia tra il 65% ed il 95%. La selegilina si fissa rapidamente e durevolmente sui recettori cerebrali specifici. La durata dell'effetto farmacologico che ne consegue è indipendente dal mantenimento dei tassi sanguigni. La selegilina viene rapidamente metabolizzata in dismetilselegilina, l-amfetamina e l-metamfetamina. Alla dose terapeutica raccomandata per il cane, questi derivati sono sprovvisti di attività farmacologica.

Titolare A.I.C.:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - Francia

Rappresentante per l'Italia:

Ceva Salute Animale S.p.A.

Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Officina di produzione:

Ceva Santé Animale

ZI Très le Bois - 22600 Loudéac - France

Officina di rilascio lotti:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - Francia