



— Pasta per uso topico per CAVALLI non DPA —

Formosulfatiazolo 50 g/100 g

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:

ACME s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE:

ACME DRUGS s.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9/A - 42025 Cavriago (RE)

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una siringa da 100 g contiene:

Principio attivo:

Formosulfatiazolo 50 g

Eccipienti:

q.b. a 100 g

INDICAZIONI

Trattamento delle lesioni chirurgiche e traumatiche della cute e dei tessuti molli.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di nota resistenza ai sulfamidici.

Non usare in animali con ipersensibilità accertata al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cavalli non Destinati alla Produzione di Alimenti per il consumo umano (cavalli non DPA).

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione:

per uso topico

Posologia:

Nelle lesioni cutanee e dei tessuti molli applicare mediante la spatola presente nella confezione, SOCATIL® pasta per uso topico per CAVALLI non DPA ogni 12 ore per 21 giorni o fino a guarigione, in quantità sufficiente per ricoprire completamente la lesione.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La pasta densa e adesiva è stata creata allo scopo di proteggere le lesioni.

La corretta somministrazione prevede di stendere il farmaco in uno strato uniforme sulla parte da medicare, rimuovendo i residui delle medicazioni precedenti.

TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

Non somministrare a cavalli allevati a scopo alimentare.

Per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere la siringa ben chiusa per proteggere il prodotto dalla luce e dal calore.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 5 giorni.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Non utilizzare in cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'uso inappropriato del prodotto può favorire fenomeni di antibiotico-resistenza al formosulfatiazolo e può ridurre l'efficacia del trattamento con i sulfamidici per un fenomeno di resistenza crociata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Persone con nota ipersensibilità ai sulfamidici devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

In persone sensibili, il contatto cutaneo con questo prodotto può causare manifestazioni cutanee delle membrane mucose con comparsa di eruzioni morbilliformi, scarlattiniformi e orticarioidi, erisipeloide, eritema nodoso e multiforme, dermatite esfoliativa e fotosensibilità.

Evitare il contatto con il prodotto mediante l'uso di guanti e spatola.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

In assenza di studi specifici sulla specie di destinazione, l'impiego in gravidanza non è raccomandato.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

SOCATIL pasta per uso orale per bovini e suini:

astuccio contenente 1 siringa da 100 g - AIC n° 100132051

astuccio contenente 2 siringhe da 100 g - AIC n° 1001320048

SOCATIL pasta per uso orale nei gatti e per uso topico nei cani:

astuccio contenente 1 siringa da 15 g - AIC n° 100132036

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate