



Soligental® 3000 UI/ml

**Collirio, soluzione
per cani e gatti**

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

VIRBAC - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros – France

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LABIANA LIFE SCIENCE, S.A

C/Venus, 26, Ind Can Parellada Terrassa - 08228 Barcelona – Spagna

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO:

SOLIGENTAL 3000 UI/ml collirio, soluzione

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPI(O) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI:

Ogni ml contiene:

Principi attivi: gentamicina (come solfato) 3000 UI

Eccipienti: Edetato di sodio, Acido Paraidrossibenzoico.

INDICAZIONI:

Nei cani e nei gatti:

Terapia delle congiuntiviti batteriche e delle cherato-congiuntiviti sostenute da batteri sensibili alla gentamicina, come confermato da antibiogramma.

CONTROINDICAZIONI:

Non utilizzare in animali con accertata ipersensibilità alla gentamicina e altri aminoglicosidi.

REAZIONI AVVERSE:

All'inizio del trattamento possono essere osservati rari casi di reazioni infiammatorie congiuntivali. Questi segni, di debole intensità e sempre transitori, scompaiono spontaneamente senza alcun trattamento specifico.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Cani e gatti.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

900 UI di gentamicina al giorno per 8 giorni consecutivi, cioè 2 gocce instillate

3 volte al giorno per 8 giorni.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE:

Instillare la soluzione nella parte inferiore del sacco congiuntivale per mezzo dell'apposito contagocce.

TEMPO DI ATTESA:

Non applicabile.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non è richiesta alcuna particolare precauzione.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola: Scade il:

Dopo l'apertura utilizzare entro 15 giorni.

AVVERTENZA(E) SPECIALE(I):**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Per evitare la contaminazione della soluzione, chiudere il flacone dopo l'uso.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con accertata ipersensibilità agli aminoglicosidi devono evitare il contatto con il prodotto. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

La Gentamicina passa attraverso la barriera placentare e può quindi, indurre effetti tossici nel feto in caso di somministrazioni di alte dosi alle madri. Tuttavia, essendo Soligental una soluzione oftalmica, l'assorbimento sistemico può essere considerato trascurabile; per questo motivo il medicinale può essere usato durante la gestazione e l'allattamento.

Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza, antidoti) se necessario

In caso di sovradosaggio, la rigenerazione dell'epitelio corneale può essere ritardata.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO**DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI:**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

08/2017

ALTRE INFORMAZIONI:

Rappresentante per la vendita in Italia:

VIRBAC SRL - Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano – Italia

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.