

STARGATE®

STANOZOLOLO 5^o/o

Iniettabile per cani e gatti

Nome e indirizzo del titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:
ACME srl - Via Portella della Ginestra, 9 - Cavriago (RE) - Italia

Nome e indirizzo del titolare dell'Autorizzazione alla produzione e Responsabile del rilascio dei lotti:

LABIANA Life Science S.A Can Parellada Industrial Terrassa 08228 Barcellona Spagna

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO e degli altri ingredienti:

1 ml contiene:

principio attivo: stanozololo 50 mg

INDICAZIONI

Terapia di supporto alle condizioni da ridotto o alterato sviluppo scheletrico, ritardato accrescimento, ipotrofia muscolare, ipotonia neuromuscolare, osteomiodistrofia giovanile, fratture a lento consolidamento, recuperi post-operatori, convalescenze, malattie croniche debilitanti, sequele cachetizzanti di malattie parassitarie.

Terapia di supporto alle malattie infettive o tumorali; anemia, magrezza di varia origine, sindromi da malassorbimento, ipopressia, leucemie granulocitarie acute, vasculiti cutanee.

Terapia di supporto alle alopecie, agli eczemi (specie dei cani anziani), alle piaghe da decubito e alle ustioni estese.

Terapia di supporto all'insufficienza renale cronica e alle epatopatie acute e croniche.

Correttore degli effetti catabolizzanti delle terapie cortisoniche prolungate, laddove salvaguarda il trofismo muscolare e la normale mineralizzazione dello scheletro.

CONTROINDICAZIONI

Non somministrare ad animali colpiti da carcinoma prostatico o ipertrofie prostatiche.

L'impiego del prodotto può essere controindicato in corso di squilibri ormonali.

REAZIONI AVVERSE:

Come tutti gli steroidi anabolizzanti lo stanozololo può provocare effetti collaterali indesiderati quali: effetto androgenizzante con incremento della libido nel maschio, comportamenti sessuali anormali nelle femmine, anestri, esacerbazione di ipertrofie e carcinomi prostatici.

Detti effetti tuttavia compaiono con scarsa frequenza alla dose terapeutica consigliata.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Cani e Gatti

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE DI DESTINAZIONE, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE:

Via di somministrazione: iniettabile per via intramuscolare

Cani di grossa taglia: 1 ml di Stargate una volta alla settimana.

Cani di piccola taglia: 0,5 ml di Stargate una volta alla settimana

Gatti: 0,5 ml di Stargate una volta alla settimana

A giudizio del medico veterinario il trattamento può essere continuato fino al pieno ristabilimento dell'animale

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

Il prodotto, come tutti gli anabolizzanti steroidei, deve essere utilizzato con cautela negli animali con squilibri ormonali data l'attività androgena propria dello stanazololo.

Non utilizzare in gravidanza.

Durante l'allattamento usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile

TEMPI DI ATTESA

Non pertinente.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in confezionamento integro ed in luogo asciutto.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Utilizzare con cautela negli animali con squilibri ormonali. Il prodotto deve essere utilizzato dopo la valutazione del rischio/beneficio da parte del medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'impiego del prodotto può essere controindicato in corso di squilibri ormonali. La presenza del conservante sodio etilmercurio-tiosalicilato sconsiglia l'iniezione del prodotto per via intrarticolare.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

In caso di autoiniezione accidentale rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Non utilizzare in gravidanza.

Durante l'allattamento usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile

Interazione con altri prodotti medicinali e altre forme di interazione

Sinergismo di potenziamento nei confronti di altri anabolizzanti steroidei.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'urgenza, antidoti) se necessario

Non si conoscono effetti acuti legati al sovradosaggio.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15 Novembre 2007

PER USO VETERINARIO

DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO VETERINARIA IN COPIA UNICA NON RIPETIBILE