

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

STOMORGYL 2 – 10 – 20

PER USO VETERINARIO

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Via Lorenzini 8 – 20139 Milano

Officina di produzione

Merial – Tolosa (Francia)

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti

Merial – Tolosa (Francia)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

STOMORGYL 2 – 10 – 20 Compresse divisibili per cani e gatti

Spiramicina, metronidazolo

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

	Stomorgyl 2	Stomorgyl 10	Stomorgyl 20
Principi attivi:			
Spiramicina	150.000 U.I.	750.000 U.I.	1.500.000 U.I.
Metronidazolo	25 mg	125 mg	250 mg
Eccipienti q.b.a	120 mg	600 mg	1.200 mg

4. INDICAZIONI

Cani e gatti:

- Infezioni della cavità orale: stomatiti, gengiviti, alitosi, periodontiti
- Infezioni della sfera oro-naso-laringea: amigdaliti, sinusiti, otiti, ecc....
- Infezioni polmonari
- Infezioni dei tessuti ghiandolari: ghiandole salivari, mammarie, anali e lacrimali
- Infezioni cutanee di tipo necrotico
- Trattamento coadiuvante delle turbe infettive e parassitarie del tubo digerente
- Infezioni diverse: osteomieliti, metriti
- Coccidiosi, toxoplasmosi

5. CONTROINDICAZIONI

Nessuna.

6. REAZIONI AVVERSE

Come per tutti i chemioterapici sono possibili rari fenomeni d'ipersensibilità quali scialorrea e vomito. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: orale

1 compressa di Stomorgyl 2 ogni 2 kg p.c. per 6/10 giorni

1 compressa di Stomorgyl 10 ogni 10 kg p.c. per 6/10 giorni

1 compressa di Stomorgyl 20 ogni 20 kg p.c. per 6/10 giorni

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna

10. TEMPI DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce e dall'umidità

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

12. AVVERTENZE SPECIALI

In caso di ipersensibilità accertata nei confronti del principio attivo, evitare il contatto con il prodotto.

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del Medico Veterinario responsabile, in particolare per quanto riguarda la presenza del metronidazolo.

La somministrazione di 1,5-3 volte la dose terapeutica massima prescritta, per 4 settimane, non provoca alcun disturbo.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

07/2018

DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA RIPETIBILE