



# AUJESZKY A SUIVAX gI-

**sospensione iniettabile per suini**

**Titolare A.I.C.:** FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)

**Fabbricante:** FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)

## **INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Una dose (2 ml) di vaccino contiene: **Principio attivo:** virus inattivato della malattia di Aujeszky. Titolo: non inferiore a  $10^9$  DICT<sub>50</sub> prima dell'inattivazione. In grado di indurre nel coniglio un titolo sieroneutralizzante (media geometrica) post vaccinazione (s.c.) non inferiore a 16.

**Adiuvante:** gel di idrossido di alluminio 40 mg.

**Conservante:** sodio etilmercurio tiosalicilato 0,2 mg.

**INDICAZIONI** - AUJESZKY A-SUIVAX gI- è indicato per la immunizzazione attiva del suino per prevenire la mortalità e ridurre i sintomi clinici della malattia di Aujeszky, l'escrezione del virus selvaggio e gli effetti negativi dell'infezione sulle prestazioni produttive.

L'immunità si mantiene per almeno 6 mesi.

**CONTROINDICAZIONI** - Nessuna nota.

**REAZIONI AVVERSE** - Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE** - Suino.

## **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Agitare energicamente prima dell'uso. Il vaccino va inoculato per via sottocutanea, preferibilmente nella fossa retroauricolare, alla dose di 2 ml per capo.

**Programma vaccinale:**

**Scrofette:** 1° intervento 4-6 settimane prima del parto; 2° intervento 2-4 settimane dopo il primo;

**Scrofe già vaccinate al primo parto:** vaccinazione di richiamo 2-4 settimane prima di ogni parto.

**Suinetti nati da scrofe vaccinate:** 1° intervento a 8-9 settimane; 2° intervento 2-4 settimane dopo il primo;

**Suinetti nati da scrofe non vaccinate:** 1° intervento a 4 settimane di età; 2° intervento 2-4 settimane dopo il primo;

**Vetri:** vaccinazione di richiamo ogni 6 mesi.

Il presente programma vaccinale va adattato in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.



## **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Il flacone contenente il vaccino deve essere agitato prima dell'uso.

**TEMPO DI ATTESA** - Zero giorni.

**PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE** - AUJESZKY A-SUIVAX gl- va conservato in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C. Non congelare. Dopo l'apertura del flacone il vaccino deve essere utilizzato immediatamente.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

## **AVVERTENZE SPECIALI**

### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Somministrare a soggetti in buone condizioni di salute rispettando le condizioni di asepsi. In caso di manifestazioni di ipersensibilità allergica, intervenire subito con anti-istaminici.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il vaccino agli animali** - In caso di autoinoculazione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento** - Usare conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

**Interazione con altri farmaci ed altre forme di interazione** - Non sono disponibili informazioni sulla compatibilità con altri vaccini, pertanto non sono state dimostrate efficacia ed innocuità di questo prodotto usato con altri.

**Sovradosaggio** - Dati non disponibili

**Incompatibilità** - Non miscelare con altri medicinali veterinari.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI** - Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivanti da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Il materiale residuo deve essere conferito negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

**DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:** 01.2012

**ALTRE INFORMAZIONI** - La malattia di Aujeszky o pseudorabbia colpisce prevalentemente il suino, con una sintomatologia variabile a seconda dell'età del soggetto: nei riproduttori interessa principalmente l'apparato genitale provocando ipofertilità transitoria nei verri, turbe della fecondità ed aborto nelle scrofe; nei suinetti la malattia si manifesta con sintomatologia nervosa ed alta mortalità nei soggetti all'ingrasso prevale generalmente la forma respiratoria responsabile di ritardi nell'accrescimento, riduzione del peso corporeo e quindi di rilevanti perdite economiche.

SOLO PER USO VETERINARIO

## **Confezioni**

Flacone da 100 ml.