



IT XEDEN® 200 mg compresse per cani
DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO:

XEDEN® 200 mg compresse per cani. Enrofloxacin.
INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI: Una compressa contiene: Enrofloxacin 200,0 mg. Compressa. Compressa a forma di quadrifoglio di colore beige con linea di frattura. La compressa può essere divisa in quattro parti uguali.

INDICAZIONI: Nei cani: trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore (associate o meno a prostatite) e infezioni del tratto urinario superiore provocate da *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis*; trattamento delle piodermiti profonde e superficiali.

CONTROINDICAZIONI: Non usare in cani giovani o in accrescimento (cani di età inferiore a 12 mesi (razze piccole) o inferiore a 18 mesi (razze grandi)) poiché il prodotto può provocare alterazioni alla cartilagine epifisaria in cuccioli in fase di crescita. Non usare in cani con disordini di natura epilettica poiché l'enrofloxacin può causare una stimolazione del SNC. Non usare in cani con nota ipersensibilità ai fluorochinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non usare in caso di resistenza ai chinoloni in quanto esiste una quasi completa resistenza crociata con altri chinoloni ed una completa resistenza crociata con altri fluorochinoloni. Non usare in concomitanza con tetracicline, fenicoli o macrolidi per potenziali effetti antagonisti. Vedi anche paragrafo "Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione".

REAZIONI AVVERSE: Possibili alterazioni alle cartilagini di congiunzione nei cuccioli in fase di crescita (vedi "Controindicazioni"). Raramente sono stati osservati vomito ed anoressia. In rari casi, possono verificarsi reazioni di ipersensibilità. In questi casi, la somministrazione del prodotto deve essere interrotta. Possono verificarsi segni neurologici (convulsioni, tremori, atassia, eccitazione). Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Cani.
POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: Per uso orale. 5 mg di enrofloxacin/kg/giorno in somministrazione in singola dose giornaliera, ovvero una compressa per 40 kg di peso al di per: 10 giorni nelle infezioni del tratto urinario inferiore, 15 giorni nelle infezioni del tratto urinario superiore e nelle infezioni del tratto urinario inferiore associate a prostatiti, fino a 21 giorni per piodermiti superficiali secondo la risposta clinica, fino a 49 giorni per piodermiti profonde secondo la risposta clinica. Riconsiderare il trattamento in caso di scarso miglioramento a metà del periodo di terapia. La compressa è divisibile e può essere usata come di seguito:

Xeden® 50 mg	Xeden® 150 mg	Xeden® 200 mg	Peso del cane (kg)	
Numero di compresse al giorno				
¼			≥ 2	< 4
½			≥ 4	< 6,5
¾	¼		≥ 6,5	< 8,5
1	¼		≥ 8,5	< 11
1 ¼	½		≥ 11	< 13,5
1 ½	½		≥ 13,5	< 17
	¾	½	≥ 17	< 25
	1	¾	≥ 25	< 35
	1 ¼	1	≥ 35	< 40
	1 ½	1	≥ 40	< 45
	1 ½	1 ¼	≥ 45	< 50
	1 ¾	1 ¼	≥ 50	< 55
	2	1 ½	≥ 55	< 65
		1 ¾	≥ 65	< 80

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE: Le compresse sono appetibili e ben accettate dai cani. Se necessario, possono essere somministrate direttamente nella bocca del cane oppure aggiunte alla razione di cibo. Istruzioni su come dividere la compressa: Mettere la compressa su una superficie piana, con il lato del solco di divisione rivolto verso il basso (lato convesso verso l'alto). Con la punta dell'indice, esercitare una lieve pressione verticale al centro della compressa per romperla nel senso della larghezza in due metà. Poi, per ottenere i quarti della compressa, esercitare una leggera pressione con l'indice al centro di una metà per romperla in due parti.

TEMPI DI ATTESA: Non pertinente.
PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservare nella confezione originale. Proteggere dalla luce.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister. Le porzioni di compresse divise non consumate entro 3 giorni devono essere eliminate. Non usare dopo la data di scadenza riportata sul blister e sulla confezione esterna.

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: L'utilizzo dei fluorochinoloni deve limitarsi al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o si ritiene possano scarsamente rispondere ad altre classi di prodotti antimicrobici. Se possibile, i fluorochinoloni devono essere usati esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma. Un utilizzo di tali prodotti diverso dalle istruzioni fornite nel RCP può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti ai fluorochinoloni e allo stesso tempo ridurre l'efficacia del trattamento con altri chinoloni a causa della resistenza crociata. Durante l'uso del medicinale veterinario è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali e locali sull'uso di prodotti antimicrobici. Usare il prodotto con cautela in cani con gravi disfunzioni renali o epatiche. La piodermite è nella maggior parte dei casi secondaria ad una patologia nascosta. È consigliabile determinare le cause di tale patologia e trattare l'animale di conseguenza. Le compresse masticabili sono aromatizzate. Al fine di evitare l'ingestione accidentale, conservare le compresse fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali: Le persone con nota ipersensibilità ai (fluoro)chinoloni devono evitare contatti con il medicinale veterinario. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo. Lavarsi le mani dopo aver maneggiato il prodotto. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione: Impiego durante la gravidanza: Studi condotti su animali da laboratorio (ratto, cinghiale) non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, fetotossico o maternotossico. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile. Impiego durante l'allattamento: Poiché l'enrofloxacin viene escreta nel latte materno, l'uso non è raccomandato durante l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: L'uso concomitante con flunixin deve essere monitorato attentamente, poiché l'interazione tra questi farmaci può provocare reazioni avverse collegate ad un ritardo nell'eliminazione degli stessi. La somministrazione concomitante di teofillina deve essere monitorata attentamente in quanto possono aumentare i livelli sierici di teofillina. L'uso concomitante di sostanze contenenti magnesio o alluminio (come antiacidi o sucralfati) può ridurre l'assorbimento di enrofloxacin. Questi medicinali devono essere assunti a distanza di due ore.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario: Il sovradosaggio può causare vomito e sintomatologia nervosa (tremori muscolari, incoordinazione e convulsioni) che possono richiedere la sospensione del trattamento. In assenza di un antidoto conosciuto, favorire l'eliminazione del farmaco e procedere con un trattamento sintomatico. Se necessario, somministrare alluminio o magnesio tramite antiacidi o carbone attivo per ridurre l'assorbimento di enrofloxacin. In letteratura, sintomi di sovradosaggio con enrofloxacin nel cane come inappetenza e disturbi gastroenterici sono stati osservati a una dose 10 volte superiore la dose raccomandata somministrata per due settimane. Nessun sintomo di intolleranza è stato osservato in cani trattati con dosaggi 5 volte superiori a quelli raccomandati per un mese.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI: I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al tuo medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 10/2021.

ALTRE INFORMAZIONI: Confezioni: Astuccio con 2 blister da 6 compresse; astuccio con 20 blister da 6 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Ceva Salute Animale S.p.A. - Viale Colleoni 15 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Ceva Santé Animale - Boulevard de la Communication - Zone Autoroutière - 53950 Louverné - Francia.