

# Zodon®

88mg-264mg



**IT** **Comprese masticabili per cani.**  
**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Zodon® 88 mg compresse masticabili per cani.  
Zodon® 264 mg compresse masticabili per cani.  
Clindamicina (come cloridrato).

**INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni compressa contiene: **Principio attivo:**

**Zodon® 88 mg**  
Clindamicina (come cloridrato) 88 mg.

**Zodon® 264 mg**  
Clindamicina (come cloridrato) 264 mg.  
Compressa masticabile. Compressa divisibile a forma di quadrifoglio di colore beige. La compressa può essere divisa in quattro parti uguali.

**INDICAZIONI**

Per il trattamento di ferite ed ascessi infetti ed infezioni della cavità orale incluse malattie periodontali causate da o associate a *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. (eccetto *Streptococcus faecalis*), *Bacteroides* spp., *Fusobacterium necrophorum* e *Clostridium perfringens*. Per il trattamento di pododermite superficiale associata a *Staphylococcus pseudintermedius*. Per il trattamento di osteomieliti causate da *Staphylococcus aureus*.

**CONTRAINDICAZIONI**

Non utilizzare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti o alla lincomicina. Non somministrare a conigli, criceti, cavie, cincillà, cavalli o ruminanti in quanto l'ingestione di clindamicina in tali specie potrebbe causare seri problemi digestivi.

**REAZIONI AVVERSE**

Sono stati riportati molto raramente vomito e diarrea.  
Reazioni di ipersensibilità e trombocitopenia sono state riportate molto raramente. Qualche volta la clindamicina causa la proliferazione di organismi non sensibili come clostridia e lieviti. In caso di sovrainfezione, devono essere adottate opportune misure correttive sulla base del quadro clinico.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informare il medico veterinario. In alternativa, segnalare tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza veterinaria ([http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4\\_8\\_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P](http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P))

**SPECIE DI DESTINAZIONE:** Cani.

**POSIZIONE PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale.  
1. Per il trattamento di ferite ed ascessi infetti ed infezioni della cavità orale incluse malattie periodontali, somministrare o:

- 5,5 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore per 7-10 giorni, o
- 11 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore per 7-10 giorni. Rivalutare la diagnosi se non si osserva un effetto terapeutico dopo 4 giorni.

2. Per il trattamento di pododermite superficiale in cani, somministrare o:

- 5,5 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore, o
- 11 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore.

Si raccomanda la terapia della pododermite superficiale per 21 giorni, con estensione della terapia sulla base della valutazione clinica.

3. Per il trattamento di osteomieliti in cani, somministrare:  
- 11 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore per un periodo minimo di 28 giorni.  
Sospendere il trattamento e rivalutare la diagnosi se non si osserva un effetto terapeutico nei primi 14 giorni.

**Per esempio:**

- Per un regime posologico di 11 mg/kg

Zodon® 88 mg	
Peso (kg)	Numero di compresse per somministrazione
1,0 - 2,0	¼ compressa
2,1 - 4,0	½ compressa
4,1 - 6,0	¾ compressa
6,1 - 8,0	1 compressa
8,1 - 10,0	1 + ¼ compresse
10,1 - 12,0	1 + ½ compresse
12,1 - 14,0	1 + ¾ compresse
14,1 - 16,0	2 compresse
Zodon® 264 mg	
Peso (kg)	Numero di compresse per somministrazione
4,5 - 6,0	¼ compressa
6,1 - 9,0	Usare Zodon® 88 mg
9,1 - 12,0	½ compressa
12,1 - 18,0	¾ compressa
18,1 - 24,0	1 compressa
24,1 - 30,0	1 + ¼ compresse
30,1 - 36,0	1 + ½ compresse
36,1 - 42,0	1 + ¾ compresse
42,1 - 48,0	2 compresse

Per un regime posologico di 5,5 mg/kg

Zodon® 88 mg	
Peso (kg)	Numero di compresse per somministrazione
2,0 - 4,0	¼ compressa
4,1 - 8,0	½ compressa
8,1 - 12,0	¾ compresse
12,1 - 16,0	1 compressa
Zodon® 264 mg	
Peso (kg)	Numero di compresse per somministrazione
4,5 - 6,0	Usare Zodon® 88 mg
6,1 - 12,0	¼ compressa
12,1 - 24,0	½ compressa
24,1 - 36,0	¾ compressa
36,1 - 48,0	1 compressa

Determinare il peso corporeo quanto più accuratamente possibile per assicurare un dosaggio corretto ed evitare sottodosaggio.

**AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Le compresse sono aromatizzate. Possono essere somministrate direttamente nella bocca degli animali o aggiunte ad una piccola quantità di cibo. Istruzioni su come dividere la compressa: Mettere la compressa su una superficie piana, con il lato del solco di divisione rivolto verso il basso (lato convesso verso l'alto). Con la punta dell'indice, esercitare una lieve pressione verticale al centro della compressa per romperla nel senso della larghezza in due metà. Poi, per ottenere i quarti della compressa, esercitare una leggera pressione con l'indice al centro di una metà per romperla in due parti.

**TEMPO DI ATTESA:** Non pertinente.

**PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare le parti delle compresse non utilizzate nel blister. Conservare il blister nella scatola di cartone. Periodo di validità delle parti di compresse non utilizzate dopo prima apertura del confezionamento primario: 72 ore (o 3 giorni). Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola di cartone e sul blister dopo EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

**AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:** Nessuna.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** Le compresse masticabili sono aromatizzate. Per evitare l'ingestione accidentale, tenere le compresse fuori dalla portata degli animali. L'uso del prodotto deve essere basato su test di sensibilità dei batteri isolati dall'animale. Prendere in considerazione le politiche antimicrobiche ufficiali nazionali e locali quando si utilizza il prodotto. L'uso del prodotto non conforme alle istruzioni fornite potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla clindamicina e potrebbe diminuire l'efficacia del trattamento con lincomicina o macrolidi antimicrobici a causa di potenziale cross-resistenza. La clindamicina e l'entromicina mostrano resistenza parallela. È stata dimostrata una cross-resistenza parziale tra la clindamicina, l'entromicina ed altri antibiotici macrolidi. In caso di terapia prolungata di un mese o più, eseguire periodicamente un controllo per la funzionalità epatiche e renali ed un emocromo. In animali con seri problemi renali e/o epatici, accompagnati da gravi disturbi metabolici, il dosaggio da somministrare deve essere determinato accuratamente e la loro condizione deve essere monitorata eseguendo opportuni controlli dei valori ematici durante il trattamento ad alti dosaggi. **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** Le persone con nota ipersensibilità ai lincomamidi (lincomicina e clindamicina) devono evitare il contatto con questo medicinale veterinario. Lavarsi le mani dopo aver maneggiato le compresse. L'ingestione accidentale può causare effetti gastro-intestinali come dolore addominale e diarrea. Prestare attenzione ad evitare l'ingestione accidentale. In caso di ingestione accidentale, particolarmente da parte di bambini, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

**Gravidanza e allattamento:** Mentre studi ad alto dosaggio in ratti suggeriscono che la clindamicina non sia teratogena e non influenzi in modo significativo le prestazioni riproduttive di maschi e femmine, non è stata stabilita la sicurezza del medicinale veterinario in cagne gravide o cani maschi riproduttori. La clindamicina passa la barriera placentare e sangue-latte. Il trattamento di femmine in lattazione può causare diarrea in cuccioli. Usare solo dopo valutazione del rapporto rischio/beneficio del medicinale veterinario responsabile. L'uso del prodotto non è consigliato nei cuccioli appena nati.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** La clindamicina cloridrato ha mostrato avere proprietà neuro-muscolari bloccanti che possono enfatizzare l'azione di altri agenti neuro-muscolari bloccanti. Il prodotto dovrebbe essere impiegato con cautela in animali a cui sono somministrati tali agenti. La clindamicina non dovrebbe essere combinata con entromicina o altri macrolidi per prevenire resistenza indotta da macrolidi alla clindamicina. La clindamicina può ridurre i livelli plasmatici di odosoprina con un rischio di mancanza di attività. Non può essere escluso il rischio di interazioni avverse (seri problemi renali) in caso di somministrazione simultanea di clindamicina ed aminoglicosidi (es. gentamicina).

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):** Dosaggi orali di clindamicina fino 300 mg/kg/giorno non hanno causato tossicità nei cani. Cani a cui sono stati somministrati 600 mg/kg/giorno di clindamicina hanno mostrato anoressia, vomito e perdita di peso. In caso di sovradosaggio sospendere il trattamento immediatamente ed adottare un trattamento sintomatico.

**INCOMPATIBILITÀ PRINCIPALI:** Non applicabile.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scampo o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:** 10/2021.

**ALTRE INFORMAZIONI**

Presentazioni:  
**Zodon® 88 mg** Scatola da 10 compresse. Scatola da 20 compresse. Scatola da 100 compresse. Scatola da 120 compresse. Scatola da 240 compresse.

**Zodon® 264 mg** Scatola da 6 compresse. Scatola da 12 compresse. Scatola da 96 compresse. Scatola da 120 compresse. Scatola da 240 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
Ceva Salute Animale S.p.A. - Viale Colleoni 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.  
Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:  
Ceva Santé Animale - Boulevard de la Communication  
Zone Autoroutière - 53950 Louvermé - Francia.